



Бюлетень радіаційного стану критичних населених пунктів на забруднених радіонуклідами територіях України





**Національний університет біоресурсів і природокористування України
Український науково-дослідний інститут
сільськогосподарської радіології**

**Бюлетень радіаційного стану критичних
населених пунктів на забруднених
радіонуклідами територіях України**

Узагальнені результати за 2004 - 2008 рр.

Київ 2008

Бюлетень радіаційного стану критичних населених пунктів на забруднених радіонуклідами територіях України підготовлено в рамках виконання програми **«Радіологічний моніторинг сільськогосподарської продукції та угідь в критичних населених пунктах України»** (Договір № 110/147-пр від 03.01.2006 р. між Українським науково-дослідним інститутом сільськогосподарської радіології і Національним аграрним університетом)

Результати цієї роботи розглянуто проблемною вченою радою УкрНДІСГР
протокол від 19.11.2008 № 3

Бюлетень підготовлено авторським колективом УкрНДІСГР НУБіП України у складі: Кашпаров В.О., Лундін С.М., Ланшин В.П., Кадигріб О.М., Хомутінін Ю.В., Лазарєв М.М., Журба М.А., Павлюченко В.В.

Зміст

	Стор.
Пояснювальна записка.....	5
Зведена таблиця даних про середній вміст ^{137}Cs в молоці ВРХ по роках у критичних населених пунктах України, з розподілом по випасах.....	7
Головна таблиця. Результати радіоекологічного моніторингу 2004-2008 рр.....	14
Стислий опис пасовищ та урочищ.....	53
Допустимі рівні вмісту радіонуклідів ^{137}Cs і ^{90}Sr у продуктах харчування та питній воді (ДР-2006).....	103

Пояснювальна записка

На територіях України, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, довготривалі ефекти аварії продовжують представляти реальний та істотний виклик проживанню та добробуту місцевого населення. Однією з найважливіших проблем серед питань ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС є проблема обмеження надходження радіонуклідів з продуктами харчування (основним джерелом надходження радіонуклідів в організм людини є молоко ВРХ) та створення необхідних умов для одержання чистої продукції на територіях які зазнали радіоактивного забруднення.

Найбільш гостро це стосується населення, що проживає на забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС територіях. Раціон харчування тут формується, головним чином за рахунок споживання продукції, що виробляється на критичних, у радіоекологічному відношенні, ландшафтах. Тому й проблема пов'язана, головним чином, з молоком корів, які випасаються на природних угіддях. Вміст ^{137}Cs в цьому молоці значно – у 5-15 разів перевищує встановлені державні нормативи. Виходячи з наведеного вище, головною метою роботи є визначення переліку найбільш критичних населених пунктів України, як об'єктів, які потребують першочергового втручання.

У бюлетені сконцентровано матеріали, одержані в процесі проведення моніторингових досліджень в найбільш критичних населених пунктах на протязі 2004 – 2008 рр. Під час проведення досліджень в кожному конкретному населеному пункті були визначені практично усі пасовища, на яких випасається ВРХ з особистих підсобних господарств. Відбір зразків молока здійснювався з прив'язкою до конкретного випасу. Іншими словами, було проведено паспортизацію місць випасу корів з прив'язкою до кожного населеного пункту. Необхідність проведення такої

роботи пов'язана з тим, що в більшості населених пунктів, ВРХ випасається не на одному пасовищі, а на декількох. При чому ці кілька пасовищ можуть характеризуватись різними коефіцієнтами надходження ^{137}Cs у молоко і не обов'язково всі вони є критичними. Високий рівень забруднення молока зумовлений випасанням худоби на не поліпшених пасовищах, розташованих на дерново-підзолистих піщаних та торфових ґрунтах, де коефіцієнти переходу ^{137}Cs з ґрунту в рослини мають дуже високі значення. Але не всі випаси є такими. Тому саме для розподілу випасів на умовно „чисті” та „забруднені” і проведено паспортизацію місць випасу корів. Такий підхід в подальшому дає можливість для коректного впровадження контрзаходів і адресного спрямування державних коштів з метою поліпшення радіологічної ситуації в найкритичніших місцях.

У головній таблиці бюлетеня наведено найдокладнішу інформацію про характер забруднення молока, приналежність худоби і місце її випасання. Результати наведені по 39 населеним пунктам. В таблиці знайшли відображення лише ті об'єкти, де має місце перевищення встановлених нормативів - Державні гігієнічні нормативи "Допустимі рівні вмісту радіонуклідів ^{137}Cs і ^{90}Sr у продуктах харчування та питній воді" (ДР-2006).

У додатках наводиться – стислий опис пасовищ і урочищ, на яких випасається худоба, практично по кожному населеному пункту, та допустимі рівні вмісту радіонуклідів ^{137}Cs і ^{90}Sr у продуктах харчування та питній воді (ДР-2006).

Для зручності користування і можливості швидко зорієнтуватись в оцінці ситуації наводимо таблицю з середніми результатами по роках, в які проводились дослідження.

Зведена таблиця даних про середній вміст ^{137}Cs в молоці ВРХ по роках
у критичних населених пунктах України, з розподілом по випасах

№№ п/п	Населений пункт	Назва випасу	Середній вміст ¹³⁷ Cs в молоці ВРХ, Бк/л				
			2004 р.	2005 р.	2006 р.	2007 р.	2008 р.
	Володимирецький район. Рівненська область						
1	с.Городок	ур.Зачимирия				206±28	
		ур.Система				153±28	
2	с.Журавлине	ур.Гринькове	238±67				
		ур.Густе	296±73				
		ур.Гукове	73±44				
	Дубровицький район. Рівненська область						
3	с.Будимля	ур.Озерецька система	103±28		80±10	202±13	69±9
		ур.Годомля, Лесца	178±48		202±47	152±25	152±13
		ур. Града	143±24				
		ур.Россоха, Токовище	744±299		433±210	563±119	238±33
		ур.Переходицька система	206±38				178±13
4	с.Великі Озера	ур.Семиражі	42±25				
		ур.Ліс	496±112				
		ур.Шахівське	69±15				
		ур.Став	19±13				
5	с.Великий Чермень	ур.Ніжбер	299±35		126±18		
		ур.Ліс, Жукова	529±189		420±55		
		ур.Бичиха	257±81				

№№ п/п	Населений пункт	Назва випасу	Середній вміст ^{137}Cs в молоці ВРХ, Бк/л				
			2004 р.	2005 р.	2006 р.	2007 р.	2008 р.
6	с.Жадень	ур.Островки	181±55				
		ур.Велике Болото	25±12				
		ур.Вязники	38±5				
7	с.Лугове	ур.Став-2	187±30				
		ур.Вали	89±7				
		ур.Забільськ	46±7				
8	с.Миляч	урочище Став-2	171±67				
		урочище Став-1	187±54				
		ур.Борок	44±5				
		ур.За дамбою	38±6				
		ур. Колодоваха	104±56				
9	с.Переброди	ур.р.Льва (Андрияки)	63±4			60±15	
		ур.Чапелька (Погиблі)	409±166			338±89	207±29
		ур.Вечка	207±152				
		ур.Грачищі (Железо)	115±14			80±23	127±5
		ур.Кремне	365±28				
		ур.Вербилков				87±26	48±7
10	с.Шахи	ур.Заброддя	53±17				
		ур. Східне	189±34				
Зарічненський район. Рівненська область							
11	с.Бір	ур. Каливорот	412±178		285±86	330±136	259±120
12	с.Борове	ур.Мулярове	428±61			201±38	150±40
		ур.Дитячі	342±57			211±58	104±30
		ур.Велике	39±4			52±11	

№№ п/п	Населений пункт	Назва випасу	Середній вміст ^{137}Cs в молоці ВРХ, Бк/л				
			2004 р.	2005 р.	2006 р.	2007 р.	2008 р.
		ур.Рибакове	48±9			38±7	48±12
13	с.Зелена Діброва	ур.Зелене				93±19	98±20
		ур.Стир				52±12	
14	с.Лисичин	ур.Мулярове	606±62		241±51	193±25	153±82
		ур.Риболов	380±141		242±36	320±50	181±100
		ур.Рядно	419±101		281±136	397±73	
15	с.Млинок	ур.Юрківське	170±45				
		ур.Потереби	40±13		20±9	87±20	
		ур.Ріг			38±13	27±6	40±10
		ур.Боровська система			27±15		
16	с.Серники	ур.Борова	62±59				297±65
		ур. Кустов'є	438±303		358±162	292±107	343±73
		ур. Мальовка	31±9		58±13		50±10
		ур.Виходи	150±82		53±23		66±7
		ур.Пльоси	227±67		56±15		
		ур.Дуплиське			81±13	169±40	
	Рокитнівський район. Рівненська область						
17	с.Березове	ур.Дуброва	77±17		26±8		
		ур.Роги	108±25				38±5
		ур.Тяжобне	130±18		115±50		63±15
		ур.Бахлицьке, Пилипи	184±51		236±84		168±40
		ур.Єльнічек	263±65		173±94		247±63
18	с.Більськ	ур.Ліс, Гребля	205±84			157±31	
		ур.Жорнівка				40±21	

№№ п/п	Населений пункт	Назва випасу	Середній вміст ^{137}Cs в молоці ВРХ, Бк/л				
			2004 р.	2005 р.	2006 р.	2007 р.	2008 р.
19	с.Будки Кам'янські	ур.Піщана	309±43				
		ур.Управо			73±26		
		ур.Гайков	115±32		67±26		
20	с.Вежиця	ур.Угорне	674±157		635±94	657±121	582±81
		ур.Довга	843±107		813±142	861±72	535±174
		ур.Терепча (Гало)	487±23		713±88	436±103	
		ур.Вишенька			339±93	260±113	472±207
21	с.Глинне	ур.Острівець				63±26	120±13
		ур.Юзефін					130±33
		ур.Мостовецьке				149±13	165±21
22	с.Грабунь	ур.Пекчецьке				198±51	183±40
		ур.Кожакове				415±191	367±81
		ур.Хребет				190±59	220±66
23	с.Дроздинь	ур.Дубники, Лючич	564±167	645±220	594±218	706±145	733±179
		ур.Курилки, Лебідь	583±144			596±77	407±74
		ур.Мутвиця	315±45				
		ур.В'язівно			266±43	273±45	187±53
24	с.Єльно	ур.Гнойно	560±193	645±255	579±175	522±81	
		ур.Омельно		436±67	247±96	178±74	
25	с.Заболоття	ур.Лисиче	211±44		198±162		231±50
		ур.Пляшівка	277±79				
		ур.Левочки, В'язівно			75±16		235±95
26	с.Залаве	ур.Шманиха			90±50		41±22
		ур.Кобила			191±74		96±22

[illegible]

№№ п/п	Населений пункт	Назва випасу	Середній вміст ^{137}Cs в молоці ВРХ, Бк/л				
			2004 р.	2005 р.	2006 р.	2007 р.	2008 р.
33	с.Карпилівка	ур. Луг			33±18		
		ур. Отбой			228±47		
34	с.Клесів	ур. Баньки	284±166		300±113	206±53	283±102
		ур. Мостище	418±117		278±34	296±97	256±117
35	с.Пугач	ур.Кремно (ліва сторона)	180±165		265±109	93±65	300±61
		ур. Кремно (права сторона)	227±38				
36	с.Рудня Карпилівська	ур. Став	220±142		96±29	67±31	
		ур. Кружок, Болото	444±390		367±287	85±10	
37	с.Федорівка	ур. Волосень				114±11	91±14
		ур. Міжпоросля				18±8	
		ур. За кладовищем				29±23	
Маневицький район. Волинська область							
38	с.Галузія	ур.Оптова	43±11		87±27	125±11	
		ур.Засернюха, Ячиння	103±28			74±27	
		ур.Кривенська	38±3				
		ур.Став, Голя	25±13		50±8	32±10	
		ур.Пастовень				29±5	
		ур.Чоботи			48±12		
39	с.Серхів	ур.Садок	131±80			261±72	
		ур.Сорока, Копань	42±11			72±9	
		ур.Вісоч	103±23			78±3	
		ур.Засвіття	43±6			39±4	

Головна таблиця. Результати радіоекологічного моніторингу 2004-2008 рр.

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	¹³⁷ Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	¹³⁷ Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
Володимирецький район. Рівненська область						
1	с. Городок					
1.1	Зачимир`я (25)	20.07.2007	15	1	245	13
1.1	Зачимир`я (25)	20.07.2007	15	2	215	14
1.1	Зачимир`я (25)	20.07.2007	15	3	190	12
1.1	Зачимир`я (25)	20.07.2007	15	4	225	15
1.1	Зачимир`я (25)	20.07.2007	15	5	220	17
1.1	Зачимир`я (25)	20.07.2007	15	6	150	20
1.1	Зачимир`я (25)	20.07.2007	15	7	200	18
1.1	Зачимир`я (25)	20.07.2007	15	8	200	20
1.2	Система (20)	20.07.2007	20	1	190	14
1.2	Система (20)	20.07.2007	20	2	125	15
1.2	Система (20)	20.07.2007	20	3	140	15
1.2	Система (20)	20.07.2007	20	4	160	10
2	с. Журавлине					
2.1	Гринькове (20)	15.07.2004	45	1	247	8
2.1	Гринькове (20)	15.07.2004	45	2	328	7
2.1	Гринькове (20)	15.07.2004	45	3	204	7
2.1	Гринькове (20)	15.07.2004	45	4	173	12
2.2	Густе (32)	15.07.2004	50	1	423	8
2.2	Густе (32)	15.07.2004	50	2	292	9
2.2	Густе (32)	15.07.2004	50	3	374	11
2.2	Густе (32)	15.07.2004	50	4	333	10
2.2	Густе (32)	15.07.2004	50	5	335	8
2.2	Густе (32)	15.07.2004	50	6	232	8
2.2	Густе (32)	15.07.2004	50	7	297	11
2.2	Густе (32)	15.07.2004	50	8	335	7
2.2	Густе (32)	15.07.2004	50	9	208	12
2.2	Густе (32)	15.07.2004	50	10	201	12
2.2	Густе (32)	15.07.2004	50	11	224	15
2.3	Гукове (12)	15.07.2004	30	1	60	18
2.3	Гукове (12)	15.07.2004	30	2	38	20
2.3	Гукове (12)	15.07.2004	30	3	122	14
Дубровицький район. Рівненська область						
3	с. Будимля					
3.1	Озерецька система (90)	19.05.2004	55	1	115	15
3.1	Озерецька система (90)	19.05.2004	55	2	70	20
3.1	Озерецька система (90)	19.05.2004	55	3	140	14
3.1	Озерецька система (90)	19.05.2004	55	4	140	15
3.1	Озерецька система (90)	19.05.2004	55	5	110	17
3.1	Озерецька система (90)	19.05.2004	55	6	70	20
3.1	Озерецька система (90)	19.05.2004	55	7	85	17
3.1	Озерецька система (90)	19.05.2004	55	8	90	15
3.1	Озерецька система (90)	25.05.2006	55	1	70	18
3.1	Озерецька система (90)	25.05.2006	55	2	80	18
3.1	Озерецька система (90)	25.05.2006	55	3	90	15
3.1	Озерецька система (90)	05.07.2007	55	1	200	15

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
3.1	Озерецька система (90)	05.07.2007	55	2	190	16
3.1	Озерецька система (90)	05.07.2007	55	3	220	14
3.1	Озерецька система (90)	05.07.2007	55	4	190	14
3.1	Озерецька система (90)	05.07.2007	55	5	210	18
3.1	Озерецька система (90)	31.07.2008	55	1	80	12
3.1	Озерецька система (90)	31.07.2008	55	2	70	15
3.1	Озерецька система (90)	31.07.2008	55	3	65	25
3.1	Озерецька система (90)	31.07.2008	55	4	60	25
3.2	Годомля, Лесца (45)	19.05.2004	45	1	230	12
3.2	Годомля, Лесца (45)	19.05.2004	45	2	180	16
3.2	Годомля, Лесца (45)	19.05.2004	45	3	195	15
3.2	Годомля, Лесца (45)	19.05.2004	45	4	220	10
3.2	Годомля, Лесца (45)	19.05.2004	45	5	115	13
3.2	Годомля, Лесца (45)	19.05.2004	45	6	125	15
3.2	Годомля, Лесца (40)	25.05.2006	45	1	230	9
3.2	Годомля, Лесца (40)	25.05.2006	45	2	210	8
3.2	Годомля, Лесца (40)	25.05.2006	45	3	245	9
3.2	Годомля, Лесца (40)	25.05.2006	45	4	240	9
3.2	Годомля, Лесца (40)	25.05.2006	45	5	110	14
3.2	Годомля, Лесца (40)	25.05.2006	45	6	180	13
3.2	Годомля, Лесца (40)	25.05.2006	45	7	200	12
3.2	Годомля, Лесца (35)	05.07.2007	45	1	180	12
3.2	Годомля, Лесца (35)	05.07.2007	45	2	147	17
3.2	Годомля, Лесца (35)	05.07.2007	45	3	130	19
3.2	Годомля, Лесца (40)	30.07.2008	45	1	165	11
3.2	Годомля, Лесца (40)	30.07.2008	45	2	140	15
3.2	Годомля, Лесца (40)	30.07.2008	45	3	150	15
3.3	Града (25)	19.05.2004	45	1	180	15
3.3	Града (25)	19.05.2004	45	2	120	16
3.3	Града (25)	19.05.2004	45	3	125	10
3.3	Града (25)	19.05.2004	45	4	140	12
3.3	Града (25)	19.05.2004	45	5	150	12
3.4	Розсоха,Токовище (60)	19.05.2004	65	1	260	9
3.4	Розсоха,Токовище (60)	19.05.2004	65	2	760	7
3.4	Розсоха,Токовище (60)	19.05.2004	65	3	820	5
3.4	Розсоха,Токовище (60)	19.05.2004	65	4	650	5
3.4	Розсоха,Токовище (60)	19.05.2004	65	5	790	7
3.4	Розсоха,Токовище (60)	19.05.2004	65	6	1185	5
3.4	Розсоха,Токовище (90)	25.05.2006	65	1	420	10
3.4	Розсоха,Токовище (90)	25.05.2006	65	2	590	9
3.4	Розсоха,Токовище (90)	25.05.2006	65	3	140	14
3.4	Розсоха,Токовище (90)	25.05.2006	65	4	580	8
3.4	Розсоха,Токовище (55)	05.07.2007	65	1	430	10
3.4	Розсоха,Токовище (55)	05.07.2007	65	2	600	9
3.4	Розсоха,Токовище (55)	05.07.2007	65	3	660	10
3.4	Розсоха,Токовище (55)	30.07.2008	65	1	250	10
3.4	Розсоха,Токовище (55)	30.07.2008	65	2	200	10
3.4	Розсоха,Токовище (55)	30.07.2008	65	3	250	8
3.4	Розсоха,Токовище (55)	30.07.2008	65	4	280	15
3.4	Розсоха,Токовище (55)	30.07.2008	65	5	210	12

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	¹³⁷ Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	¹³⁷ Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
3.5	Переходицька Система(90)	19.05.2004	75	1	195	10
3.5	Переходицька Система(90)	19.05.2004	75	2	210	12
3.5	Переходицька Система(90)	19.05.2004	75	3	265	12
3.5	Переходицька Система(90)	19.05.2004	75	4	160	16
3.5	Переходицька Система(90)	19.05.2004	75	5	200	10
3.5	Переходицька Система(80)	30.07.2008	75	1	165	15
3.5	Переходицька Система(80)	30.07.2008	75	2	175	12
3.5	Переходицька Система(80)	30.07.2008	75	3	175	15
3.5	Переходицька Система(80)	30.07.2008	75	4	200	13
3.5	Переходицька Система(80)	30.07.2008	75	5	175	14
4	<i>с.Великі Озера</i>					
4.1	Семиражі (140)	15.05.2004	30	1	75	20
4.1	Семиражі (140)	15.05.2004	30	2	55	21
4.1	Семиражі (140)	15.05.2004	30	3	15	20
4.1	Семиражі (140)	15.05.2004	30	4	20	30
4.1	Семиражі (140)	15.05.2004	30	5	45	21
4.2	Ліс (25)	15.05.2004	70	1	600	9
4.2	Ліс (25)	15.05.2004	70	2	630	9
4.2	Ліс (25)	15.05.2004	70	3	450	12
4.2	Ліс (25)	15.05.2004	70	4	380	11
4.2	Ліс (25)	15.05.2004	70	5	420	10
4.3	Шахівське (110)	15.05.2004	50	1	65	20
4.3	Шахівське (110)	15.05.2004	50	2	70	22
4.3	Шахівське (110)	15.05.2004	50	3	60	16
4.3	Шахівське (110)	15.05.2004	50	4	80	16
4.3	Шахівське (110)	15.05.2004	50	5	55	20
4.3	Шахівське (110)	15.05.2004	50	6	65	16
4.3	Шахівське (110)	15.05.2004	50	7	60	15
4.3	Шахівське (110)	15.05.2004	50	8	100	15
4.4	Став (60)	15.05.2004	35	1	10	25
4.4	Став (60)	15.05.2004	35	2	20	26
4.4	Став (60)	15.05.2004	35	3	20	26
4.4	Став (60)	15.05.2004	35	4	15	30
4.4	Став (60)	15.05.2004	35	5	15	30
4.4	Став (60)	15.05.2004	35	6	20	26
4.4	Став (60)	15.05.2004	35	7	10	25
4.4	Став (60)	15.05.2004	35	8	10	30
4.4	Став (60)	15.05.2004	35	9	15	30
4.4	Став (60)	15.05.2004	35	10	55	25
	<i>Стійловий період</i>	14.03.2005		1	50	20

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
	Стійловий період	14.03.2005		2	285	12
	Стійловий період	14.03.2005		3	25	22
	Стійловий період	14.03.2005		4	70	20
	Стійловий період	14.03.2005		5	245	15
	Стійловий період	14.03.2005		6	96	16
5	с. Великий Черемель					
5.1	Ніжбер (30)	20.05.2004	70	1	300	12
5.1	Ніжбер (30)	20.05.2004	70	2	315	12
5.1	Ніжбер (30)	20.05.2004	70	3	290	15
5.1	Ніжбер (30)	20.05.2004	70	4	325	15
5.1	Ніжбер (30)	20.05.2004	70	5	275	10
5.1	Ніжбер (30)	20.05.2004	70	6	340	9
5.1	Ніжбер (30)	20.05.2004	70	7	280	9
5.1	Ніжбер (30)	20.05.2004	70	8	355	7
5.1	Ніжбер (30)	20.05.2004	70	9	260	12
5.1	Ніжбер (30)	20.05.2004	70	10	245	10
5.1	Ніжбер (25)	26.05.2006	70	1	120	15
5.1	Ніжбер (25)	26.05.2006	70	2	120	15
5.1	Ніжбер (25)	26.05.2006	70	3	140	18
5.1	Ніжбер (25)	26.05.2006	70	4	100	16
5.1	Ніжбер (25)	26.05.2006	70	5	150	15
5.1	Ніжбер (25)	26.05.2006	70	6	120	18
5.2	Ліс, Жукова (20)	20.05.2004	135	1	900	7
5.2	Ліс, Жукова (20)	20.05.2004	135	2	505	9
5.2	Ліс, Жукова (20)	20.05.2004	135	3	440	9
5.2	Ліс, Жукова (20)	20.05.2004	135	4	520	10
5.2	Ліс, Жукова (20)	20.05.2004	135	5	380	12
5.2	Ліс, Жукова (20)	20.05.2004	135	6	430	8
5.2	Жукова (15)	26.05.2006	50	1	460	8
5.2	Жукова (15)	26.05.2006	50	2	450	10
5.2	Жукова (15)	26.05.2006	50	3	340	12
5.2	Жукова (15)	26.05.2006	50	4	430	10
5.3	Бичиха (12)	26.05.2006	45	1	330	11
5.3	Бичиха (12)	26.05.2006	45	2	270	12
5.3	Бичиха (12)	26.05.2006	45	3	170	12
6	с. Жадень					
6.1	Островки (75)	20.09.2004	40	1	220	8
6.1	Островки (75)	20.09.2004	40	2	250	8
6.1	Островки (75)	20.09.2004	40	3	210	10
6.1	Островки (75)	20.09.2004	40	4	200	11
6.1	Островки (75)	20.09.2004	40	5	140	13
6.1	Островки (75)	20.09.2004	40	6	90	15
6.1	Островки (75)	20.09.2004	40	7	210	8
6.1	Островки (75)	20.09.2004	40	8	130	10
6.2	Велике Болото (80)	20.09.2004	25	1	43	15
6.2	Велике Болото (80)	20.09.2004	25	2	15	17
6.2	Велике Болото (80)	20.09.2004	25	3	35	15
6.2	Велике Болото (80)	20.09.2004	25	4	25	15
6.2	Велике Болото (80)	20.09.2004	25	5	15	24

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
6.2	Велике Болото (80)	20.09.2004	25	6	14	22
6.3	Вязники (50)	20.09.2004	20	1	40	18
6.3	Вязники (50)	20.09.2004	20	2	30	19
6.3	Вязники (50)	20.09.2004	20	3	36	18
6.3	Вязники (50)	20.09.2004	20	4	45	15
6.3	Вязники (50)	20.09.2004	20	5	35	14
6.3	Вязники (50)	20.09.2004	20	6	40	16
7	с.Лугове					
7.1	Став-2 (40)	10.10.2004	25	1	140	12
7.1	Став-2 (40)	10.10.2004	25	2	155	10
7.1	Став-2 (40)	10.10.2004	25	3	200	12
7.1	Став-2 (40)	10.10.2004	25	4	170	11
7.1	Став-2 (40)	10.10.2004	25	5	200	9
7.1	Став-2 (40)	10.10.2004	25	6	205	9
7.1	Став-2 (40)	10.10.2004	25	7	190	14
7.1	Став-2 (40)	10.10.2004	25	8	205	12
7.1	Став-2 (40)	10.10.2004	25	9	240	12
7.1	Став-2 (40)	10.10.2004	25	10	160	16
7.2	Вали (35)	10.10.2004	20	1	85	20
7.2	Вали (35)	10.10.2004	20	2	80	22
7.2	Вали (35)	10.10.2004	20	3	100	18
7.2	Вали (35)	10.10.2004	20	4	90	18
7.2	Вали (35)	10.10.2004	20	5	95	20
7.2	Вали (35)	10.10.2004	20	6	85	17
7.3	Забільськ (80)	10.10.2004	25	1	40	25
7.3	Забільськ (80)	10.10.2004	25	2	50	25
7.3	Забільськ (80)	10.10.2004	25	3	46	30
7.3	Забільськ (80)	10.10.2004	25	4	34	23
7.3	Забільськ (80)	10.10.2004	25	5	55	22
7.3	Забільськ (80)	10.10.2004	25	6	51	25
7.3	Забільськ (80)	10.10.2004	25	7	45	20
8	с.Миляч					
8.1	Став - 2 (70)	10.05.2004	25	1	220	12
8.1	Став - 2 (70)	10.05.2004	25	2	240	10
8.1	Став - 2 (70)	10.05.2004	25	3	110	15
8.1	Став - 2 (70)	10.05.2004	25	4	120	15
8.1	Став - 2 (70)	12.08.2004	25	1	300	9
8.1	Став - 2 (70)	12.08.2004	25	2	110	14
8.1	Став - 2 (70)	12.08.2004	25	3	100	16
8.1	Став - 2 (70)	02.10.2004	25	1	230	12
8.1	Став - 2 (70))	02.10.2004	25	2	120	13
8.1	Став - 2 (70)	02.10.2004	25	3	155	16
8.1	Став - 2 (70)	02.10.2004	25	4	180	16
8.2	Став - 1 (85)	10.05.2004	25	1	190	18
8.2	Став - 1 (85)	10.05.2004	25	2	150	16
8.2	Став - 1 (85)	10.05.2004	25	3	100	16
8.2	Став - 1 (85)	10.05.2004	25	4	120	18
8.2	Став - 1 (85)	12.08.2004	25	1	270	11
8.2	Став - 1 (85)	12.08.2004	25	2	240	10
8.2	Став - 1 (85)	12.08.2004	25	3	190	15

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
8.2	Став - 1 (85)	12.08.2004	25	4	130	17
8.2	Став - 1 (85)	02.10.2004	25	1	245	9
8.2	Став - 1 (85)	02.10.2004	25	2	160	12
8.2	Став - 1 (85)	02.10.2004	25	3	250	10
8.2	Став - 1 (85)	02.10.2004	25	4	180	12
8.2	Став - 1 (85)	02.10.2004	25	5	210	9
8.3	Борок (93)	10.05.2004	30	1	45	18
8.3	Борок (93)	10.05.2004	30	2	50	18
8.3	Борок (93)	10.05.2004	30	3	40	20
8.3	Борок (93)	10.05.2004	30	4	35	22
8.3	Борок (93)	10.05.2004	30	5	42	22
8.3	Борок (93)	12.08.2004	30	1	40	18
8.3	Борок (93)	12.08.2004	30	2	40	19
8.3	Борок (93)	12.08.2004	30	3	50	20
8.3	Борок (93)	12.08.2004	30	4	50	18
8.4	За дамбою (25)	02.10.2004	25	1	30	20
8.4	За дамбою (25)	02.10.2004	25	2	45	22
8.4	За дамбою (25)	02.10.2004	25	3	40	20
8.4	За дамбою (25)	02.10.2004	25	4	35	17
8.5	Колодоваха (96)	02.10.2004	33	1	150	14
8.5	Колодоваха (96)	02.10.2004	33	2	155	14
8.5	Колодоваха (96)	02.10.2004	33	3	120	18
8.5	Колодоваха (96)	02.10.2004	33	4	70	16
8.5	Колодоваха (96)	02.10.2004	33	5	24	20
	Стійловий період	14.03.2005		1	100	18
	Стійловий період	14.03.2005		2	35	20
	Стійловий період	14.03.2005		3	65	17
	Стійловий період	14.03.2005		4	32	17
	Стійловий період	14.03.2005		5	36	20
9	с.Переброди					
9.1	Чапелька (55)	18.05.2004	60	1	430	10
9.1	Чапелька (55)	18.05.2004	60	2	470	12
9.1	Чапелька (55)	18.05.2004	60	3	610	8
9.1	Чапелька (55)	18.05.2004	60	4	365	8
9.1	Чапелька (55)	18.05.2004	60	5	410	10
9.1	Чапелька (55)	18.05.2004	60	6	560	9
9.1	Чапелька (55)	18.05.2004	60	7	60	16
9.1	Чапелька (55)	18.05.2004	60	8	365	10
9.1	Чапелька (Погиблі) (90)	05.07.2007	60	1	400	11
9.1	Чапелька (Погиблі) (90)	05.07.2007	60	2	360	10
9.1	Чапелька (Погиблі) (90)	05.07.2007	60	3	360	10
9.1	Чапелька (Погиблі) (90)	05.07.2007	60	4	477	5
9.1	Чапелька (Погиблі) (90)	05.07.2007	60	5	270	14
9.1	Чапелька (Погиблі) (90)	05.07.2007	60	6	210	13
9.1	Чапелька (Погиблі) (90)	05.07.2007	60	7	290	13
9.1	Чапелька (Погиблі) (85)	29.07.2008	60	1	190	12
9.1	Чапелька (Погиблі) (85)	29.07.2008	60	2	245	10
9.1	Чапелька (Погиблі) (85)	29.07.2008	60	3	230	12
9.1	Чапелька (Погиблі) (85)	29.07.2008	60	4	215	12
9.1	Чапелька (Погиблі) (85)	29.07.2008	60	5	160	15

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
9.1	Чапелька (Погиблі) (85)	29.07.2008	60	6	190	15
9.1	Чапелька (Погиблі) (85)	29.07.2008	60	7	170	15
9.1	Чапелька (Погиблі) (85)	29.07.2008	60	8	220	10
9.1	Чапелька (Погиблі) (85)	29.07.2008	60	9	225	10
9.2	Вербилков (90)	05.07.2007	35	1	70	16
9.2	Вербилков (90)	05.07.2007	35	2	105	16
9.2	Вербилков (90)	05.07.2007	35	3	110	14
9.2	Вербилков (90)	05.07.2007	35	4	50	20
9.2	Вербилков (90)	05.07.2007	35	5	100	14
9.2	Вербилков (80)	29.07.2008	35	1	40	30
9.2	Вербилков (80)	29.07.2008	35	2	60	25
9.2	Вербилков (80)	29.07.2008	35	3	50	30
9.2	Вербилков (80)	29.07.2008	35	4	40	30
9.2	Вербилков (80)	29.07.2008	35	5	50	27
9.2	Вербилков (80)	29.07.2008	35	6	50	25
9.3	Вечка (80)	18.05.2004	55	1	100	18
9.3	Вечка (80)	18.05.2004	55	2	460	8
9.3	Вечка (80)	18.05.2004	55	3	310	8
9.3	Вечка (80)	18.05.2004	55	4	130	15
9.3	Вечка (80)	18.05.2004	55	5	60	20
9.3	Вечка (80)	18.05.2004	55	6	70	21
9.3	Вечка (80)	18.05.2004	55	7	390	8
9.3	Вечка (80)	18.05.2004	55	8	260	9
9.3	Вечка (80)	18.05.2004	55	9	80	18
9.4	Грачищі (Железо) (40)	18.05.2004	40	1	95	20
9.4	Грачищі (Железо) (40)	18.05.2004	40	2	135	6
9.4	Грачищі (Железо) (40)	15.07.2007	40	1	60	21
9.4	Грачищі (Железо) (40)	15.07.2007	40	2	80	25
9.4	Грачищі (Железо) (55)	29.07.2008	35	1	150	15
9.4	Грачищі (Железо) (55)	29.07.2008	35	2	90	25
9.4	Грачищі (Железо) (55)	29.07.2008	35	3	140	15
9.4	Грачищі (Железо) (55)	29.07.2008	35	4	130	15
9.4	Грачищі (Железо) (55)	29.07.2008	35	5	110	12
9.4	Грачищі (Железо) (55)	29.07.2008	35	6	140	16
9.5	р.Льва, Андряки (65)	18.05.2004	35	1	65	18
9.5	р.Льва, Андряки (65)	18.05.2004	35	2	60	17
9.5	р.Льва, Андряки (75)	15.07.2007	35	1	60	30
9.5	р.Льва, Андряки (75)	15.07.2007	35	2	35	22
9.5	р.Льва, Андряки (75)	15.07.2007	35	3	90	25
9.5	р.Льва, Андряки (75)	15.07.2007	35	4	45	15
9.5	р.Льва, Андряки (75)	15.07.2007	35	5	65	20
9.5	р.Льва, Андряки (75)	15.07.2007	35	6	62	25
9.5	р.Льва, Андряки (75)	15.07.2007	35	7	70	30
9.5	р.Льва, Андряки (75)	15.07.2007	35	8	70	28
9.5	р.Льва, Андряки (75)	15.07.2007	35	9	50	30
9.5	р.Льва, Андряки (75)	15.07.2007	35	10	60	21
10	с.Шахи					
10.1	Заброддя (30)	15.05.2004	85	1	75	22
10.1	Заброддя (30)	15.05.2004	85	2	45	26
10.1	Заброддя (30)	15.05.2004	85	3	40	26

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	¹³⁷ Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	¹³⁷ Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
10.1	Заброддя (30)	15.05.2004	85	4	50	19
10.1	Заброддя (30)	15.05.2004	85	5	55	20
10.1	Заброддя (30)	15.05.2004	85	6	90	20
10.1	Заброддя (30)	15.05.2004	85	7	40	27
10.1	Заброддя (30)	15.05.2004	85	8	55	27
10.1	Заброддя (30)	15.05.2004	85	9	35	25
10.1	Заброддя (30)	15.05.2004	85	10	40	18
10.1	Заброддя (30)	15.05.2004	85	11	60	21
10.2	Східне (24)	15.05.2004	45	1	140	16
10.2	Східне (24)	15.05.2004	45	2	190	15
10.2	Східне (24)	15.05.2004	45	3	210	11
10.2	Східне (24)	15.05.2004	45	4	230	11
10.2	Східне (24)	15.05.2004	45	5	215	13
10.2	Східне (24)	15.05.2004	45	6	170	15
10.2	Східне (24)	15.05.2004	45	7	140	14
10.2	Східне (24)	15.05.2004	45	8	230	10
10.2	Східне (24)	15.05.2004	45	9	165	11
10.2	Східне (24)	15.05.2004	45	10	200	9
Зарічнлянський район. Рівненська область						
11	с.Бір					
11.1	Каливорот (25)	15.07.2004	90	1	571	8
11.1	Каливорот (25)	15.07.2004	90	2	119	12
11.1	Каливорот (25)	15.07.2004	90	3	523	9
11.1	Каливорот (25)	15.07.2004	90	4	677	7
11.1	Каливорот (25)	15.07.2004	90	5	490	7
11.1	Каливорот (25)	15.07.2004	90	6	380	12
11.1	Каливорот (25)	15.07.2004	90	7	636	6
11.1	Каливорот (25)	15.07.2004	90	8	518	6
11.1	Каливорот (25)	15.07.2004	90	9	438	9
11.1	Каливорот (25)	15.07.2004	90	10	242	12
11.1	Каливорот (25)	15.07.2004	90	11	344	10
11.1	Каливорот (25)	15.07.2004	90	12	167	12
11.1	Каливорот (25)	15.07.2004	90	13	255	11
11.1	Каливорот (22)	11.10.2006	90	1	210	12
11.1	Каливорот (22)	11.10.2006	90	2	265	9
11.1	Каливорот (22)	11.10.2006	90	3	350	9
11.1	Каливорот (22)	11.10.2006	90	4	225	12
11.1	Каливорот (22)	11.10.2006	90	5	390	8
11.1	Каливорот (22)	11.10.2006	90	6	450	8
11.1	Каливорот (22)	11.10.2006	90	7	320	10
11.1	Каливорот (22)	11.10.2006	90	8	200	9
11.1	Каливорот (22)	11.10.2006	90	9	180	14
11.1	Каливорот (22)	11.10.2006	90	10	240	12
11.1	Каливорот (22)	11.10.2006	90	11	310	12
11.1	Каливорот (18)	08.06.2007	90	1	310	12
11.1	Каливорот (18)	08.06.2007	90	2	445	9
11.1	Каливорот (18)	08.06.2007	90	3	470	9
11.1	Каливорот (18)	08.06.2007	90	4	170	10
11.1	Каливорот (18)	08.06.2007	90	5	215	12

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
11.1	Каливорот (18)	08.06.2007	90	6	490	12
11.1	Каливорот (18)	08.06.2007	90	7	230	11
11.1	Каливорот (18)	08.06.2007	90	8	400	11
11.1	Каливорот (18)	08.06.2007	90	9	150	10
11.1	Каливорот (18)	08.06.2007	90	10	395	10
11.1	Каливорот (25)	20.10.2008	90	1	125	20
11.1	Каливорот (25)	20.10.2008	90	2	325	10
11.1	Каливорот (25)	20.10.2008	90	3	335	11
11.1	Каливорот (25)	20.10.2008	90	4	300	12
11.1	Каливорот (25)	20.10.2008	90	5	235	12
11.1	Каливорот (25)	20.10.2008	90	6	320	14
11.1	Каливорот (25)	20.10.2008	90	7	250	10
11.1	Каливорот (25)	20.10.2008	90	8	180	15
12	с.Борове					
12.1	Мулярове (50)	18.07.2004	22	1	367	9
12.1	Мулярове (50)	18.07.2004	22	2	324	9
12.1	Мулярове (50)	18.07.2004	22	3	490	11
12.1	Мулярове (50)	18.07.2004	22	4	460	11
12.1	Мулярове (50)	18.07.2004	22	5	422	9
12.1	Мулярове (50)	18.07.2004	22	6	501	10
12.1	Мулярове (50)	18.07.2004	22	7	485	8
12.1	Мулярове (50)	18.07.2004	22	8	390	8
12.1	Мулярове (45)	18.07.2004	22	9	410	11
12.1	Мулярове (45)	15.06.2007	22	1	195	10
12.1	Мулярове (45)	15.06.2007	22	2	155	9
12.1	Мулярове (45)	15.06.2007	22	3	261	8
12.1	Мулярове (45)	15.06.2007	22	4	195	10
12.1	Мулярове (45)	15.06.2007	22	5	200	12
12.1	Мулярове (23)	21.10.2008	22	1	150	11
12.1	Мулярове (23)	21.10.2008	22	2	145	15
12.1	Мулярове (23)	21.10.2008	22	3	140	20
12.1	Мулярове (23)	21.10.2008	22	4	190	17
12.1	Мулярове (23)	21.10.2008	22	5	110	20
12.1	Мулярове (23)	21.10.2008	22	6	165	15
12.2	Дитячі (100)	18.07.2004	25	1	301	12
12.2	Дитячі (100)	18.07.2004	25	2	232	12
12.2	Дитячі (100)	18.07.2004	25	3	385	9
12.2	Дитячі (100)	18.07.2004	25	4	389	9
12.2	Дитячі (100)	18.07.2004	25	5	312	12
12.2	Дитячі (100)	18.07.2004	25	6	370	9
12.2	Дитячі (100)	18.07.2004	25	7	345	9
12.2	Дитячі (85)	18.07.2004	25	8	400	7
12.2	Дитячі (85)	15.06.2007	23	1	158	10
12.2	Дитячі (85)	15.06.2007	23	2	165	9
12.2	Дитячі (85)	15.06.2007	23	3	185	9
12.2	Дитячі (85)	15.06.2007	23	4	261	6
12.2	Дитячі (85)	15.06.2007	23	5	285	6
12.2	Дитячі (25)	21.10.2008	23	1	70	30
12.2	Дитячі (25)	21.10.2008	23	2	115	17

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
12.2	Дитячі (25)	21.10.2008	23	3	130	20
12.2	Дитячі (25)	21.10.2008	23	4	85	17
12.2	Дитячі (25)	21.10.2008	23	5	120	14
12.3	Велике (300)	18.07.2004	45	1	37	20
12.3	Велике (300)	18.07.2004	45	2	40	18
12.3	Велике (300)	18.07.2004	45	3	37	22
12.3	Велике (300)	18.07.2004	45	4	47	22
12.3	Велике (300)	18.07.2004	45	5	44	26
12.3	Велике (300)	18.07.2004	45	6	39	26
12.3	Велике (300)	18.07.2004	45	7	35	22
12.3	Велике (300)	18.07.2004	45	8	35	19
12.3	Велике (285)	15.06.2007	45	1	45	15
12.3	Велике (285)	15.06.2007	45	2	50	15
12.3	Велике (285)	15.06.2007	45	3	70	18
12.3	Велике (285)	15.06.2007	45	4	55	15
12.3	Велике (285)	15.06.2007	45	5	50	19
12.3	Велике (285)	15.06.2007	45	6	35	20
12.3	Велике (285)	15.06.2007	45	7	60	15
12.4	Рибакове (120)	18.07.2004	20	1	41	20
12.4	Рибакове (120)	18.07.2004	20	2	51	19
12.4	Рибакове (120)	18.07.2004	20	3	48	22
12.4	Рибакове (120)	18.07.2004	20	4	36	21
12.4	Рибакове (120)	18.07.2004	20	5	42	20
12.4	Рибакове (120)	18.07.2004	20	6	62	18
12.4	Рибакове (120)	18.07.2004	20	7	53	22
12.4	Рибакове (135)	15.06.2007	20	1	40	16
12.4	Рибакове (135)	15.06.2007	20	2	35	16
12.4	Рибакове (135)	15.06.2007	20	3	25	12
12.4	Рибакове (135)	15.06.2007	20	4	45	10
12.4	Рибакове (135)	15.06.2007	20	5	40	13
12.4	Рибакове (135)	15.06.2007	20	6	37	15
12.4	Рибакове (135)	15.06.2007	20	7	45	15
12.4	Рибакове (250)	21.10.2008	20	1	60	20
12.4	Рибакове (250)	21.10.2008	20	2	65	24
12.4	Рибакове (250)	21.10.2008	20	3	35	25
12.4	Рибакове (250)	21.10.2008	20	4	45	25
12.4	Рибакове (250)	21.10.2008	20	5	40	15
12.4	Рибакове (250)	21.10.2008	20	6	55	16
13	<i>с. Зелена Діброва</i>					
13.1	Зелене (30)	08.06.2007	25	1	120	10
13.1	Зелене (30)	08.06.2007	25	2	75	10
13.1	Зелене (30)	08.06.2007	25	3	70	9
13.1	Зелене (30)	08.06.2007	25	4	110	9
13.1	Зелене (30)	08.06.2007	25	5	95	11
13.1	Зелене (30)	08.06.2007	25	6	90	11
13.1	Зелене (27)	20.10.2008	25	1	80	25
13.1	Зелене (27)	20.10.2008	25	2	70	25
13.1	Зелене (27)	20.10.2008	25	3	120	18
13.1	Зелене (27)	20.10.2008	25	4	110	20

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	¹³⁷ Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	¹³⁷ Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
13.1	Зелене (27)	20.10.2008	25	5	112	15
13.1	Зелене (27)	20.10.2008	25	6	85	20
13.1	Зелене (27)	20.10.2008	25	7	110	15
13.2	Стир (65)	08.06.2007	30	1	40	15
13.2	Стир (65)	08.06.2007	30	2	55	15
13.2	Стир (65)	08.06.2007	30	3	70	18
13.2	Стир (65)	08.06.2007	30	4	45	10
13.2	Стир (65)	08.06.2007	30	5	48	10
14	с.Лисичин					
14.1	Мулярове (30)	17.07.2004	17	1	593	9
14.1	Мулярове (30)	17.07.2004	17	2	551	9
14.1	Мулярове (30)	17.07.2004	17	3	673	5
14.1	Мулярове (25)	21.09.2006	17	1	290	12
14.1	Мулярове (25)	21.09.2006	17	2	280	10
14.1	Мулярове (25)	21.09.2006	17	3	200	10
14.1	Мулярове (25)	21.09.2006	17	4	195	14
14.1	Мулярове (23)	15.06.2007	15	1	185	10
14.1	Мулярове (23)	15.06.2007	15	2	200	10
14.1	Мулярове (23)	15.06.2007	15	3	205	9
14.1	Мулярове (23)	15.06.2007	15	4	220	9
14.1	Мулярове (23)	15.06.2007	15	5	155	11
14.1	Мулярове (13)	21.10.2008	15	1	215	10
14.1	Мулярове (13)	21.10.2008	15	2	100	20
14.1	Мулярове (13)	21.10.2008	15	3	200	17
14.1	Мулярове (13)	21.10.2008	15	4	165	20
14.1	Мулярове (13)	21.10.2008	15	5	185	15
14.2	Риболов (50)	17.07.2004	20	1	469	8
14.2	Риболов (50)	17.07.2004	20	2	471	8
14.2	Риболов (50)	17.07.2004	20	3	508	6
14.2	Риболов (50)	17.07.2004	20	4	242	10
14.2	Риболов (50)	17.07.2004	20	5	212	9
14.2	Риболов (50)	21.09.2006	20	1	190	11
14.2	Риболов (50)	21.09.2006	20	2	260	7
14.2	Риболов (50)	21.09.2006	20	3	285	10
14.2	Риболов (50)	21.09.2006	20	4	250	9
14.2	Риболов (50)	21.09.2006	20	5	225	9
14.2	Риболов (45)	15.06.2007	20	1	300	10
14.2	Риболов (45)	15.06.2007	20	2	310	9
14.2	Риболов (45)	15.06.2007	20	3	385	9
14.2	Риболов (45)	15.06.2007	20	4	255	12
14.2	Риболов (45)	15.06.2007	20	5	350	10
14.2	Риболов (40)	20.10.2008	20	1	115	15
14.2	Риболов (40)	20.10.2008	20	2	106	18
14.2	Риболов (40)	20.10.2008	20	3	290	14
14.2	Риболов (40)	20.10.2008	20	4	280	14
14.2	Риболов (40)	20.10.2008	20	5	115	14
14.2	Риболов (40)	20.10.2008	20	6	180	17
14.2	Риболов (40)	20.10.2008	20	7	100	20
14.2	Риболов (40)	20.10.2008	20	8	260	12

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	¹³⁷ Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	¹³⁷ Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
14.3	Рядно (23)	17.07.2004	15	1	484	7
14.3	Рядно (23)	17.07.2004	15	2	417	7
14.3	Рядно (23)	17.07.2004	15	3	221	10
14.3	Рядно (23)	17.07.2004	15	4	506	5
14.3	Рядно (23)	17.07.2004	15	5	508	5
14.3	Рядно (23)	17.07.2004	15	6	377	11
14.3	Рядно (23)	17.07.2004	15	7	417	9
14.3	Рядно (20)	11.09.2006	15	1	490	6
14.3	Рядно (20)	11.09.2006	15	2	305	7
14.3	Рядно (20)	11.09.2006	15	3	190	10
14.3	Рядно (20)	11.09.2006	15	4	285	11
14.3	Рядно (20)	11.09.2006	15	5	135	14
14.3	Рядно (28)	15.06.2007	15	1	470	7
14.3	Рядно (28)	15.06.2007	15	2	475	7
14.3	Рядно (28)	15.06.2007	15	3	315	9
14.3	Рядно (28)	15.06.2007	15	4	341	12
14.3	Рядно (28)	15.06.2007	15	5	382	11
15	с.Млинок					
15.1	Юрківське (70)	18.07.2004	30	1	180	13
15.1	Юрківське (70)	18.07.2004	30	2	133	12
15.1	Юрківське (70)	18.07.2004	30	3	119	16
15.1	Юрківське (70)	18.07.2004	30	4	232	10
15.1	Юрківське (70)	18.07.2004	30	5	186	13
15.2	Потереби (140)	18.07.2004	25	1	27	25
15.2	Потереби (140)	18.07.2004	25	2	38	20
15.2	Потереби (140)	18.07.2004	25	3	25	20
15.2	Потереби (140)	18.07.2004	25	4	25	25
15.2	Потереби (140)	18.07.2004	25	5	30	25
15.2	Потереби (140)	18.07.2004	25	6	43	19
15.2	Потереби (140)	18.07.2004	25	7	58	21
15.2	Потереби (140)	18.07.2004	25	8	53	20
15.2	Потереби (140)	18.07.2004	25	9	49	21
15.2	Потереби (140)	18.07.2004	25	10	39	20
15.2	Потереби (140)	18.07.2004	25	11	50	18
15.2	Потереби (140)	18.07.2004	25	12	59	18
15.2	Потереби (25)	21.09.2006	23	1	30	25
15.2	Потереби (25)	21.09.2006	23	2	15	25
15.2	Потереби (25)	21.09.2006	23	3	15	30
15.2	Потереби (25)	12.06.2007	23	1	75	10
15.2	Потереби (25)	12.06.2007	23	2	64	9
15.2	Потереби (25)	12.06.2007	23	3	68	2
15.2	Потереби (25)	12.06.2007	23	4	110	12
15.2	Потереби (25)	12.06.2007	23	5	85	18
15.2	Потереби (25)	12.06.2007	23	6	90	15
15.2	Потереби (25)	12.06.2007	23	7	115	10
15.3	Ріг (65)	21.09.2006	25	1	30	25
15.3	Ріг (65)	21.09.2006	25	2	55	22
15.3	Ріг (65)	21.09.2006	25	3	35	23
15.3	Ріг (65)	21.09.2006	25	4	30	23
15.3	Ріг (65)	12.06.2007	25	1	20	15

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
15.3	Pir (65)	12.06.2007	25	2	26	15
15.3	Pir (65)	12.06.2007	25	3	25	20
15.3	Pir (65)	12.06.2007	25	4	35	16
15.3	Pir (65)	12.06.2007	25	5	30	10
15.3	Pir (150)	21.10.2008	25	1	25	25
15.3	Pir (150)	21.10.2008	25	2	45	30
15.3	Pir (150)	21.10.2008	25	3	40	30
15.3	Pir (150)	21.10.2008	25	4	50	25
15.3	Pir (150)	21.10.2008	25	5	45	25
15.3	Pir (150)	21.10.2008	25	6	40	30
15.3	Pir (150)	21.10.2008	25	7	35	30
15.3	Pir (150)	21.10.2008	25	8	40	30
15.4	Боровська система (50)	21.09.2006	20	1	40	20
15.4	Боровська система (50)	21.09.2006	20	2	45	24
15.4	Боровська система (50)	21.09.2006	20	3	40	23
15.4	Боровська система (50)	21.09.2006	20	4	55	20
15.4	Боровська система (50)	21.09.2006	20	5	30	25
15.4	Боровська система (50)	21.09.2006	20	6	26	25
15.4	Боровська система (50)	21.09.2006	20	7	10	30
16	<i>с.Серники</i>					
16.1	Борова (35)	16.07.2004	85	1	101	15
16.1	Борова (35)	16.07.2004	85	2	166	15
16.1	Борова (35)	16.07.2004	85	3	37	26
16.1	Борова (35)	16.07.2004	85	4	30	20
16.1	Борова (35)	16.07.2004	85	5	17	25
16.1	Борова (35)	16.07.2004	85	6	23	20
16.1	Борова (30)	20.10.2008	85	1	370	12
16.1	Борова (30)	20.10.2008	85	2	340	10
16.1	Борова (30)	20.10.2008	85	3	250	13
16.1	Борова (30)	20.10.2008	85	4	230	13
16.1	Борова (30)	20.10.2008	85	5	240	15
16.1	Борова (30)	20.10.2008	85	6	350	10
16.2	Кустов`є (20)	16.07.2004	50	1	512	12
16.2	Кустов`є (20)	16.07.2004	50	2	46	15
16.2	Кустов`є (20)	16.07.2004	50	3	779	6
16.2	Кустов`є (20)	16.07.2004	50	4	211	12
16.2	Кустов`є (20)	16.07.2004	50	5	640	8
16.2	Кустов`є (15)	20.09.2006	50	1	360	9
16.2	Кустов`є (15)	20.09.2006	50	2	60	14
16.2	Кустов`є (15)	20.09.2006	50	3	310	10
16.2	Кустов`є (15)	20.09.2006	50	4	490	11
16.2	Кустов`є (15)	20.09.2006	50	5	450	9
16.2	Кустов`є (15)	20.09.2006	50	6	480	9
16.2	Кустов`є (15)	10.07.2007	50	1	440	10
16.2	Кустов`є (15)	10.07.2007	50	2	215	11
16.2	Кустов`є (15)	10.07.2007	50	3	240	9
16.2	Кустов`є (15)	10.07.2007	50	4	370	9
16.2	Кустов`є (15)	10.07.2007	50	5	195	10
16.2	Кустов`є (12)	20.10.2008	50	1	440	10

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	¹³⁷ Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	¹³⁷ Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
16.2	Кустов`є (12)	20.10.2008	50	2	345	15
16.2	Кустов`є (12)	20.10.2008	50	3	280	20
16.2	Кустов`є (12)	20.10.2008	50	4	330	12
16.2	Кустов`є (12)	20.10.2008	50	5	320	10
16.3	Мальовка (180)	16.07.2004	55	1	35	20
16.3	Мальовка (180)	16.07.2004	55	2	21	25
16.3	Мальовка (180)	16.07.2004	55	3	37	20
16.3	Мальовка (140)	20.09.2006	55	1	55	22
16.3	Мальовка (140)	20.09.2006	55	2	65	18
16.3	Мальовка (140)	20.09.2006	55	3	40	23
16.3	Мальовка (140)	20.09.2006	55	4	70	20
16.3	Мальовка (100)	20.10.2008	55	1	60	26
16.3	Мальовка (100)	20.10.2008	55	2	40	25
16.3	Мальовка (100)	20.10.2008	55	3	80	18
16.3	Мальовка (100)	20.10.2008	55	4	50	20
16.3	Мальовка (100)	20.10.2008	55	5	40	15
16.4	Виходи (60)	16.07.2004	35	1	99	17
16.4	Виходи (60)	16.07.2004	35	2	215	13
16.4	Виходи (60)	20.09.2006	35	1	45	20
16.4	Виходи (60)	20.09.2006	35	2	25	25
16.4	Виходи (60)	20.09.2006	35	3	60	22
16.4	Виходи (60)	20.09.2006	35	4	80	18
16.4	Виходи (45)	20.10.2008	35	1	60	16
16.4	Виходи (45)	20.10.2008	35	2	70	20
16.4	Виходи (45)	20.10.2008	35	3	65	15
16.4	Виходи (45)	20.10.2008	35	4	60	15
16.4	Виходи (45)	20.10.2008	35	5	75	19
16.5	Пльоси (200)	16.07.2004	70	1	263	10
16.5	Пльоси (200)	16.07.2004	70	2	133	12
16.5	Пльоси (200)	16.07.2004	70	3	285	11
16.5	Пльоси (200)	16.07.2004	70	4	228	11
16.5	Пльоси (200)	20.09.2006	70	1	35	20
16.5	Пльоси (200)	20.09.2006	70	2	70	16
16.5	Пльоси (200)	20.09.2006	70	3	60	16
16.5	Пльоси (200)	20.09.2006	70	4	60	22
16.6	Дуплиське (150)	20.09.2006	27	1	65	20
16.6	Дуплиське (150)	20.09.2006	27	2	80	14
16.6	Дуплиське (150)	20.09.2006	27	3	85	14
16.6	Дуплиське (150)	20.09.2006	27	4	95	17
16.6	Дуплиське (135)	10.07.2007	25	1	140	10
16.6	Дуплиське (135)	10.07.2007	25	2	145	10
16.6	Дуплиське (135)	10.07.2007	25	3	134	8
16.6	Дуплиське (135)	10.07.2007	25	4	216	89
16.6	Дуплиське (135)	10.07.2007	25	5	210	12
Рокитнівський район. Рівненська область						
17	с.Березове					
17.1	Дуброва (120)	10.06.2004	35	1	85	16
17.1	Дуброва (120)	10.06.2004	35	2	90	15
17.1	Дуброва (120)	10.06.2004	35	3	90	15

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
17.1	Дуброва (120)	10.06.2004	35	4	50	18
17.1	Дуброва (120)	10.06.2004	35	5	70	16
17.1	Дуброва (110)	07.06.2006	35	1	25	20
17.1	Дуброва (110)	07.06.2006	35	2	20	25
17.1	Дуброва (110)	07.06.2006	35	3	20	25
17.1	Дуброва (110)	07.06.2006	35	4	40	20
17.1	Дуброва (110)	07.06.2006	35	5	25	18
17.2	Роги (75)	10.06.2004	25	1	150	16
17.2	Роги (75)	10.06.2004	25	2	110	16
17.2	Роги (75)	10.06.2004	25	3	90	18
17.2	Роги (75)	10.06.2004	25	4	90	18
17.2	Роги (75)	10.06.2004	25	5	100	14
17.2	Роги (80)	28.08.2008	25	1	45	10
17.2	Роги (80)	28.08.2008	25	2	35	10
17.2	Роги (80)	28.08.2008	25	3	35	12
17.2	Роги (80)	28.08.2008	25	4	40	15
17.3	Тяжобне (120)	10.06.2004	45	1	140	10
17.3	Тяжобне (120)	10.06.2004	45	2	150	12
17.3	Тяжобне (120)	10.06.2004	45	3	100	12
17.3	Тяжобне (120)	10.06.2004	45	4	130	15
17.3	Тяжобне (120)	10.06.2004	45	5	125	15
17.3	Тяжобне (120)	10.06.2004	45	6	130	14
17.3	Тяжобне (120)	10.06.2004	45	7	120	13
17.3	Тяжобне (120)	10.06.2004	45	8	160	15
17.3	Тяжобне (120)	10.06.2004	45	9	120	15
17.3	Тяжобне (110)	07.06.2006	45	1	195	15
17.3	Тяжобне (110)	07.06.2006	45	2	70	20
17.3	Тяжобне (110)	07.06.2006	45	3	60	19
17.3	Тяжобне (110)	07.06.2006	45	4	80	19
17.3	Тяжобне (110)	07.06.2006	45	5	150	12
17.3	Тяжобне (110)	07.06.2006	45	6	140	12
17.3	Тяжобне (110)	07.06.2006	45	7	110	15
17.3	Тяжобне (135)	28.08.2008	40	1	75	25
17.3	Тяжобне (135)	28.08.2008	40	2	42	11
17.3	Тяжобне (135)	28.08.2008	40	3	65	17
17.3	Тяжобне (135)	28.08.2008	40	4	70	20
17.4	Бахлицьке, Пилипи (150)	10.06.2004	25	1	160	12
17.4	Бахлицьке, Пилипи (150)	10.06.2004	25	2	250	10
17.4	Бахлицьке, Пилипи (150)	10.06.2004	25	3	150	14
17.4	Бахлицьке, Пилипи (150)	10.06.2004	25	4	120	13
17.4	Бахлицьке, Пилипи (150)	10.06.2004	25	5	140	13
17.4	Бахлицьке, Пилипи (150)	10.06.2004	25	6	180	14
17.4	Бахлицьке, Пилипи (150)	10.06.2004	25	7	235	12

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	¹³⁷ Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	¹³⁷ Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
17.4	Бахлицьке, Пилипи (150)	10.06.2004	25	8	240	10
17.4	Бахлицьке, Пилипи (120)	07.06.2006	25	1	340	10
17.4	Бахлицьке, Пилипи (120)	07.06.2006	25	2	180	15
17.4	Бахлицьке, Пилипи (120)	07.06.2006	25	3	180	15
17.4	Бахлицьке, Пилипи (120)	07.06.2006	25	4	345	12
17.4	Бахлицьке, Пилипи (120)	07.06.2006	25	5	160	12
17.4	Бахлицьке, Пилипи (120)	07.06.2006	25	1	210	10
17.4	Бахлицьке, Пилипи (145)	28.08.2008	23	2	175	7
17.4	Бахлицьке, Пилипи (145)	28.08.2008	23	3	125	7
17.4	Бахлицьке, Пилипи (145)	28.08.2008	23	4	220	4
17.4	Бахлицьке, Пилипи (145)	28.08.2008	23	5	155	9
17.5	Єльничек (90)	10.06.2004	30	1	340	9
17.5	Єльничек (90)	10.06.2004	30	2	270	9
17.5	Єльничек (90)	10.06.2004	30	3	310	11
17.5	Єльничек (90)	10.06.2004	30	4	200	10
17.5	Єльничек (90)	10.06.2004	30	5	200	9
17.5	Єльничек (90)	10.06.2004	30	6	340	9
17.5	Єльничек (90)	10.06.2004	30	7	260	10
17.5	Єльничек (90)	10.06.2004	30	8	290	12
17.5	Єльничек (90)	10.06.2004	30	9	160	14
17.5	Єльничек (95)	07.06.2006	30	1	230	9
17.5	Єльничек (95)	07.06.2006	30	2	85	15
17.5	Єльничек (95)	07.06.2006	30	3	180	12
17.5	Єльничек (95)	07.06.2006	30	4	90	16
17.5	Єльничек (95)	07.06.2006	30	5	70	18
17.5	Єльничек (95)	07.06.2006	30	6	250	11
17.5	Єльничек (95)	07.06.2006	30	7	310	8
17.5	Єльничек (120)	28.08.2008	30	1	315	10
17.5	Єльничек (120)	28.08.2008	30	2	190	5
17.5	Єльничек (120)	28.08.2008	30	3	235	5
	Стійловий період	15.03.2005		1	70	20
	Стійловий період	15.03.2005		2	140	16
	Стійловий період	15.03.2005		3	55	25
	Стійловий період	15.03.2005		4	67	25
	Стійловий період	15.03.2005		5	220	9
	Стійловий період	15.03.2005		6	945	6
	Стійловий період	15.03.2005		7	410	8
18	с.Більськ					
18.1	Ліс, Гребля (120)	08.11.2004	20	1	140	15

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
18.1	Ліс, Гребля (120)	08.11.2004	20	2	110	16
18.1	Ліс, Гребля (120)	08.11.2004	20	3	380	11
18.1	Ліс, Гребля (120)	08.11.2004	20	4	200	12
18.1	Ліс, Гребля (120)	08.11.2004	20	5	170	10
18.1	Ліс, Гребля (120)	08.11.2004	20	6	210	11
18.1	Ліс, Гребля (120)	08.11.2004	20	7	300	9
18.1	Ліс, Гребля (120)	08.11.2004	20	8	175	10
18.1	Ліс, Гребля (120)	08.11.2004	20	9	240	9
18.1	Ліс, Гребля (120)	08.11.2004	20	10	120	13
18.1	Гребля (90)	16.05.2007	14	1	200	14
18.1	Гребля (90)	16.05.2007	14	2	125	15
18.1	Гребля (90)	16.05.2007	14	3	120	20
18.1	Гребля (90)	16.05.2007	14	4	160	19
18.1	Гребля (90)	16.05.2007	14	5	190	18
18.1	Гребля (90)	16.05.2007	14	6	145	20
18.1	Гребля (90)	16.05.2007	14	7	175	20
18.1	Гребля (90)	16.05.2007	14	8	200	13
18.1	Гребля (90)	16.05.2007	14	9	110	20
18.1	Гребля (90)	16.05.2007	14	10	155	12
18.1	Гребля (90)	16.05.2007	14	11	150	20
18.2	Жорнівка (45)	16.05.2007	10	1	15	50
18.2	Жорнівка (45)	16.05.2007	10	2	18	50
18.2	Жорнівка (45)	16.05.2007	10	3	65	25
18.2	Жорнівка (45)	16.05.2007	10	4	58	25
18.2	Жорнівка (45)	16.05.2007	10	5	35	30
18.2	Жорнівка (45)	16.05.2007	10	6	50	30
19	с.Будки- Кам'янські					
19.1	Управо (55)	20.09.2006	25	1	120	18
19.1	Управо (55)	20.09.2006	25	2	80	22
19.1	Управо (55)	20.09.2006	25	3	60	22
19.1	Управо (55)	20.09.2006	25	4	55	26
19.1	Управо (55)	20.09.2006	25	5	75	25
19.1	Управо (55)	20.09.2006	25	6	50	25
19.2	Піщана (27)	10.07.2004	55	1	269	12
19.2	Піщана (27)	10.07.2004	55	2	258	10
19.2	Піщана (27)	10.07.2004	55	3	336	9
19.2	Піщана (27)	10.07.2004	55	4	356	9
19.2	Піщана (27)	10.07.2004	55	5	326	9
19.3	Гайков (65)	10.07.2004	80	1	76	18
19.3	Гайков (65)	10.07.2004	80	2	82	18
19.3	Гайков (65)	10.07.2004	80	3	110	14
19.3	Гайков (65)	10.07.2004	80	4	105	14
19.3	Гайков (65)	10.07.2004	80	5	99	14
19.3	Гайков (65)	10.07.2004	80	6	137	11
19.3	Гайков (65)	10.07.2004	80	7	140	16
19.3	Гайков (65)	10.07.2004	80	8	180	13
19.3	Гайков (65)	10.07.2004	80	9	93	15
19.3	Гайков (65)	10.07.2004	80	10	130	12
19.3	Гайков, Піщана (30)	20.09.2006	80	1	120	18
19.3	Гайков, Піщана (30)	20.09.2006	80	2	45	25

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	¹³⁷ Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	¹³⁷ Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
19.3	Гайков, Піщана (30)	20.09.2006	80	3	54	19
19.3	Гайков, Піщана (30)	20.09.2006	80	4	50	19
19.3	Гайков, Піщана (30)	20.09.2006	80	5	65	22
19.3	Гайков, Піщана (30)	20.09.2006	80	6	90	20
19.3	Гайков, Піщана (30)	20.09.2006	80	7	45	25
19.3	Гайков, Піщана (30)	20.09.2006	80	8	65	20
20	с.Везиця					
20.1	Угорне (90)	10.06.2004	35	1	760	9
20.1	Угорне (90)	11.06.2004	35	2	660	9
20.1	Угорне (90)	12.06.2004	35	3	780	7
20.1	Угорне (90)	13.06.2004	35	4	860	8
20.1	Угорне (90)	14.06.2004	35	5	700	7
20.1	Угорне (90)	15.06.2004	35	6	950	5
20.1	Угорне (90)	16.06.2004	35	7	460	9
20.1	Угорне (90)	17.06.2004	35	8	600	9
20.1	Угорне (90)	18.06.2004	35	9	530	8
20.1	Угорне (90)	19.06.2004	35	10	470	8
20.1	Угорне (90)	20.06.2004	35	11	640	6
20.1	Угорне (125)	08.06.2006	35	1	430	6
20.1	Угорне (125)	08.06.2006	35	2	700	5
20.1	Угорне (125)	08.06.2006	35	3	670	9
20.1	Угорне (125)	08.06.2006	35	4	630	6
20.1	Угорне (125)	08.06.2006	35	5	645	6
20.1	Угорне (125)	08.06.2006	35	6	690	8
20.1	Угорне (125)	08.06.2006	35	7	680	8
20.1	Угорне (130)	04.07.2007	33	1	650	10
20.1	Угорне (130)	04.07.2007	33	2	510	9
20.1	Угорне (130)	04.07.2007	33	3	805	9
20.1	Угорне (130)	04.07.2007	33	4	660	7
20.1	Угорне (150)	02.06.2008	33	1	455	8
20.1	Угорне (150)	02.06.2008	33	2	626	5
20.1	Угорне (150)	02.06.2008	33	3	655	7
20.1	Угорне (150)	02.06.2008	33	4	550	7
20.1	Угорне (150)	02.06.2008	33	5	625	9
20.2	Довга (90)	10.06.2004	40	1	900	6
20.2	Довга (90)	10.06.2004	40	2	950	5
20.2	Довга (90)	10.06.2004	40	3	900	5
20.2	Довга (90)	10.06.2004	40	4	970	8
20.2	Довга (90)	10.06.2004	40	5	780	8
20.2	Довга (90)	10.06.2004	40	6	620	10
20.2	Довга (90)	10.06.2004	40	7	790	9
20.2	Довга (90)	10.06.2004	40	8	850	9
20.2	Довга (120)	08.06.2006	50	1	790	10
20.2	Довга (120)	08.06.2006	50	2	710	6
20.2	Довга (120)	08.06.2006	50	3	700	6
20.2	Довга (120)	08.06.2006	50	4	780	8
20.2	Довга (120)	08.06.2006	50	5	580	8
20.2	Довга (120)	08.06.2006	50	6	910	8
20.2	Довга (120)	08.06.2006	50	7	1100	4
20.2	Довга (120)	08.06.2006	50	8	820	7

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
20.2	Довга (120)	08.06.2006	50	9	850	7
20.2	Довга (120)	08.06.2006	50	10	740	10
20.2	Довга (120)	08.06.2006	50	11	750	9
20.2	Довга (120)	08.06.2006	50	12	790	9
20.2	Довга (120)	08.06.2006	50	13	1020	5
20.2	Довга (120)	08.06.2006	50	14	660	8
20.2	Довга (120)	08.06.2006	50	15	1000	7
20.2	Довга (95)	04.07.2007	50	1	800	8
20.2	Довга (95)	04.07.2007	50	2	810	9
20.2	Довга (95)	04.07.2007	50	3	880	6
20.2	Довга (95)	04.07.2007	50	4	955	5
20.2	Довга (130)	02.06.2008	50	1	755	7
20.2	Довга (130)	02.06.2008	50	2	530	6
20.2	Довга (130)	02.06.2008	50	3	330	10
20.2	Довга (130)	02.06.2008	50	4	525	9
20.3	Терепча (Гало) (35)	10.06.2004	35	1	460	10
20.3	Терепча (Гало) (35)	10.06.2004	35	2	500	9
20.3	Терепча (Гало) (35)	10.06.2004	35	3	500	9
20.3	Терепча (Гало) (60)	08.06.2006	35	1	750	6
20.3	Терепча (Гало) (60)	08.06.2006	35	2	580	10
20.3	Терепча (Гало) (60)	08.06.2006	35	3	800	8
20.3	Терепча (Гало) (60)	08.06.2006	35	4	680	9
20.3	Терепча (Гало) (60)	08.06.2006	35	5	815	9
20.3	Терепча (Гало) (60)	08.06.2006	35	6	625	9
20.3	Терепча (Гало) (60)	08.06.2006	35	7	740	10
20.3	Терепча (Гало) (65)	04.07.2007	35	1	518	10
20.3	Терепча (Гало) (65)	04.07.2007	35	2	320	8
20.3	Терепча (Гало) (65)	04.07.2007	35	3	470	10
20.4	Вишенька (70)	08.06.2006	45	1	270	12
20.4	Вишенька (70)	08.06.2006	45	2	215	10
20.4	Вишенька (70)	08.06.2006	45	3	405	9
20.4	Вишенька (70)	08.06.2006	45	4	370	11
20.4	Вишенька (70)	08.06.2006	45	5	435	10
20.4	Вишенька (65)	04.07.2007	45	1	340	13
20.4	Вишенька (65)	04.07.2007	45	2	180	13
20.4	Вишенька (90)	02.06.2008	40	1	750	8
20.4	Вишенька (90)	02.06.2008	40	2	375	10
20.4	Вишенька (90)	02.06.2008	40	3	705	7
20.4	Вишенька (90)	02.06.2008	40	4	430	9
20.4	Вишенька (90)	02.06.2008	40	5	270	9
20.4	Вишенька (90)	02.06.2008	40	6	300	7
21	с. Глинне					
	Стійловий період	06.12.2004		1	250	10
	Стійловий період	06.12.2004		2	270	11
	Стійловий період	06.12.2004		3	40	20
	Стійловий період	06.12.2004		4	140	16
	Стійловий період	06.12.2004		5	55	18
	Стійловий період	06.12.2004		6	110	є2
	Стійловий період	06.12.2004		7	40	23
	Стійловий період	06.12.2004		8	290	11

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
	Стійловий період	06.12.2004		9	55	18
	Стійловий період	06.12.2004		10	215	9
	Стійловий період	06.12.2004		11	80	19
	Стійловий період	06.12.2004		12	75	15
	Стійловий період	06.12.2004		13	50	15
	Стійловий період	06.12.2004		14	170	12
	Стійловий період	06.12.2004		15	90	10
	Стійловий період	06.12.2004		16	40	16
	Стійловий період	06.12.2004		17	23	20
	Стійловий період	06.12.2004		18	30	25
21.1	Острівець (35)	17.10.2007	22	1	45	30
21.1	Острівець (35)	17.10.2007	22	2	50	25
21.1	Острівець (35)	17.10.2007	22	3	45	30
21.1	Острівець (35)	17.10.2007	22	4	110	25
21.1	Острівець (35)	17.10.2007	22	5	52	22
21.1	Острівець (35)	17.10.2007	22	6	75	15
21.1	Острівець (30)	25.06.2008	20	1	130	19
21.1	Острівець (30)	25.06.2008	20	2	105	15
21.1	Острівець (30)	25.06.2008	20	3	125	12
21.2	Юзефін (25)	25.06.2008	17	4	120	15
21.2	Юзефін (25)	25.06.2008	17	5	100	16
21.2	Юзефін (25)	25.06.2008	17	6	165	10
21.3	Мостовецьке (90)	17.10.2007	15	1	150	22
21.3	Мостовецьке (90)	17.10.2007	15	2	150	20
21.3	Мостовецьке (90)	17.10.2007	15	3	160	20
21.3	Мостовецьке (90)	17.10.2007	15	4	130	15
21.3	Мостовецьке (90)	17.10.2007	15	5	165	10
21.3	Мостовецьке (90)	17.10.2007	15	6	140	12
21.3	Мостовецьке (120)	25.06.2008	15	1	160	8
21.3	Мостовецьке (120)	25.06.2008	15	2	160	14
21.3	Мостовецьке (120)	25.06.2008	15	3	145	14
21.3	Мостовецьке (120)	25.06.2008	15	4	200	12
21.3	Мостовецьке (120)	25.06.2008	15	5	160	15
22	с.Грабунь					
22.1	Пекчецьке (22)	16.10.2007	25	1	280	14
22.1	Пекчецьке (22)	16.10.2007	25	2	210	15
22.1	Пекчецьке (22)	16.10.2007	25	3	130	8
22.1	Пекчецьке (22)	16.10.2007	25	4	240	15
22.1	Пекчецьке (22)	16.10.2007	25	5	230	17
22.1	Пекчецьке (22)	16.10.2007	25	6	160	19
22.1	Пекчецьке (22)	16.10.2007	25	7	180	12
22.1	Пекчецьке (22)	16.10.2007	25	8	155	20
22.1	Пекчецьке (20)	25.06.2008	28	1	155	15
22.1	Пекчецьке (20)	25.06.2008	28	2	130	15
22.1	Пекчецьке (20)	25.06.2008	28	3	155	12
22.1	Пекчецьке (20)	25.06.2008	28	4	215	12
22.1	Пекчецьке (20)	25.06.2008	28	5	200	8
22.1	Пекчецьке (20)	25.06.2008	28	6	180	11
22.1	Пекчецьке (20)	25.06.2008	28	7	205	11
22.1	Пекчецьке (20)	25.06.2008	28	8	260	11

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	¹³⁷ Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	¹³⁷ Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
22.1	Пекчецьке (20)	25.06.2008	28	9	155	14
22.2	Кожакове (30)	16.10.2007	22	1	550	10
22.2	Кожакове (30)	16.10.2007	22	2	280	10
22.2	Кожакове (32)	25.06.2008	22	1	320	13
22.2	Кожакове (32)	25.06.2008	22	2	460	9
22.2	Кожакове (32)	25.06.2008	22	3	320	8
22.3	Хребет (25)	16.10.2007	30	1	140	20
22.3	Хребет (25)	16.10.2007	30	2	275	12
22.3	Хребет (25)	16.10.2007	30	3	175	20
22.3	Хребет (25)	16.10.2007	30	4	170	15
22.3	Хребет (23)	25.06.2008	25	1	160	12
22.3	Хребет (23)	25.06.2008	25	2	290	11
22.3	Хребет (23)	25.06.2008	25	3	210	12
23	<i>с.Дроздинь</i>					
23.1	Лючич, Дубники (200)	09.06.2004	45	1	510	9
23.1	Лючич, Дубники (200)	09.06.2004	45	2	540	9
23.1	Лючич, Дубники (200)	09.06.2004	45	3	680	7
23.1	Лючич, Дубники (200)	09.06.2004	45	4	920	6
23.1	Лючич, Дубники (200)	09.06.2004	45	5	670	9
23.1	Лючич, Дубники (200)	09.06.2004	45	6	670	10
23.1	Лючич, Дубники (200)	09.06.2004	45	7	550	7
23.1	Лючич, Дубники (200)	09.06.2004	45	8	540	7
23.1	Лючич, Дубники (200)	09.06.2004	45	9	330	12
23.1	Лючич, Дубники (200)	09.06.2004	45	10	430	11
23.1	Лючич, Дубники (200)	09.06.2004	45	11	370	10
23.1	Лючич, Дубники (180)	27.05.2005	45	1	735	7
23.1	Лючич, Дубники (180)	27.05.2005	45	2	625	7
23.1	Лючич, Дубники (180)	27.05.2005	45	3	250	10
23.1	Лючич, Дубники (180)	27.05.2005	45	4	860	6
23.1	Лючич, Дубники (180)	27.05.2005	45	5	320	11
23.1	Лючич, Дубники (180)	27.05.2005	45	6	840	5
23.1	Лючич, Дубники (180)	27.05.2005	45	7	755	5
23.1	Лючич, Дубники (180)	27.05.2005	45	8	650	10
23.1	Лючич, Дубники (180)	27.05.2005	45	9	775	7
23.1	Лючич, Дубники (180)	20.06.2006	45	1	800	5
23.1	Лючич, Дубники (180)	20.06.2006	45	2	890	4
23.1	Лючич, Дубники (180)	20.06.2006	45	3	740	5
23.1	Лючич, Дубники (180)	20.06.2006	45	4	470	7
23.1	Лючич, Дубники (180)	20.06.2006	45	5	450	11
23.1	Лючич, Дубники (180)	20.06.2006	45	6	760	6
23.1	Лючич, Дубники (180)	20.06.2006	45	7	530	9
23.1	Лючич, Дубники (180)	20.06.2006	45	8	560	10
23.1	Лючич, Дубники (180)	20.06.2006	45	9	600	5
23.1	Лючич, Дубники (180)	20.06.2006	45	10	520	10
23.1	Лючич, Дубники (180)	20.06.2006	45	11	580	6
23.1	Лючич, Дубники (180)	20.06.2006	45	12	500	6
23.1	Лючич, Дубники (180)	20.06.2006	45	13	440	10
23.1	Лючич, Дубники (180)	20.06.2006	45	14	480	7
23.1	Лючич, Дубники (160)	05.07.2007	45	1	770	7
23.1	Лючич, Дубники (160)	05.07.2007	45	2	450	11

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
23.1	Лючич, Дубники (160)	05.07.2007	45	3	900	12
23.1	Лючич, Дубники (180)	16.06.2008	45	1	745	5
23.1	Лючич, Дубники (180)	16.06.2008	45	2	890	5
23.1	Лючич, Дубники (180)	16.06.2008	45	3	670	7
23.1	Лючич, Дубники (180)	16.06.2008	45	4	880	5
23.1	Лючич, Дубники (180)	16.06.2008	45	5	480	8
23.2	Лебідь, Курилки (150)	09.06.2004	80	1	730	7
23.2	Лебідь, Курилки (150)	09.06.2004	80	2	800	6
23.2	Лебідь, Курилки (150)	09.06.2004	80	3	250	11
23.2	Лебідь, Курилки (150)	09.06.2004	80	4	560	10
23.2	Лебідь, Курилки (150)	09.06.2004	80	5	720	9
23.2	Лебідь, Курилки (150)	09.06.2004	80	6	600	9
23.2	Лебідь, Курилки (150)	09.06.2004	80	7	560	11
23.2	Лебідь, Курилки (150)	09.06.2004	80	8	570	8
23.2	Лебідь, Курилки (150)	09.06.2004	80	9	650	8
23.2	Лебідь, Курилки (150)	09.06.2004	80	10	600	10
23.2	Лебідь, Курилки (150)	09.06.2004	80	11	520	11
23.2	Лебідь, Курилки (170)	05.07.2007	80	1	435	8
23.2	Лебідь, Курилки (170)	05.07.2007	80	2	550	9
23.2	Лебідь, Курилки (170)	05.07.2007	80	3	520	11
23.2	Лебідь, Курилки (170)	05.07.2007	80	4	450	10
23.2	Лебідь, Курилки (170)	05.07.2007	80	5	530	9
23.2	Лебідь, Курилки (170)	05.07.2007	80	6	800	8
23.2	Лебідь, Курилки (170)	05.07.2007	80	7	890	8
23.2	Лебідь, Курилки (155)	16.06.2008	80	1	385	11
23.2	Лебідь, Курилки (155)	16.06.2008	80	2	375	10
23.2	Лебідь, Курилки (155)	16.06.2008	80	3	345	12
23.2	Лебідь, Курилки (155)	16.06.2008	80	4	535	7
23.2	Лебідь, Курилки (155)	16.06.2008	80	5	395	9
23.3	Мутвиця (150)	09.06.2004	30	1	230	12
23.3	Мутвиця (150)	09.06.2004	30	2	340	9
23.3	Мутвиця (150)	09.06.2004	30	3	310	9
23.3	Мутвиця (150)	09.06.2004	30	4	290	12
23.3	Мутвиця (150)	09.06.2004	30	5	330	12
23.3	Мутвиця (150)	09.06.2004	30	6	340	9
23.3	Мутвиця (150)	09.06.2004	30	7	370	9
23.4	В'язівно (90)	20.06.2006	50	1	210	11
23.4	В'язівно (90)	20.06.2006	50	2	350	8
23.4	В'язівно (90)	20.06.2006	50	3	240	12
23.4	В'язівно (90)	20.06.2006	50	4	260	10
23.4	В'язівно (90)	20.06.2006	50	5	250	12
23.4	В'язівно (90)	20.06.2006	50	6	250	12
23.4	В'язівно (90)	20.06.2006	50	7	230	11
23.4	В'язівно (90)	20.06.2006	50	8	300	12
23.4	В'язівно (90)	20.06.2006	50	9	300	10
23.4	В'язівно (90)	05.07.2007	50	1	320	8
23.4	В'язівно (90)	05.07.2007	50	2	270	10
23.4	В'язівно (90)	05.07.2007	50	3	230	13

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	¹³⁷ Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	¹³⁷ Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
23.4	В'язівно (95)	16.06.2008	50	1	190	12
23.4	В'язівно (95)	16.06.2008	50	2	110	15
23.4	В'язівно (95)	16.06.2008	50	3	215	10
23.4	В'язівно (95)	16.06.2008	50	4	230	9
	Стійловий період	15.03.2005		1	445	9
	Стійловий період	15.03.2005		2	280	11
	Стійловий період	15.03.2005		3	430	9
	Стійловий період	15.03.2005		4	285	10
	Стійловий період	15.03.2005		5	585	7
	Стійловий період	15.03.2005		6	320	8
	Стійловий період	15.03.2005		7	856	7
	Стійловий період	15.03.2005		8	250	11
	Стійловий період	15.03.2005		9	320	10
	Стійловий період	15.03.2005		10	755	9
	Стійловий період	15.03.2005		11	840	8
	Стійловий період	15.03.2005		12	735	8
	Стійловий період	15.03.2005		13	775	9
	Стійловий період	15.03.2005		14	650	10
	Стійловий період	15.03.2005		15	625	9
24	с.Єльне					
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	1	475	10
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	2	670	9
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	3	370	11
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	4	870	7
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	5	460	8
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	6	620	9
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	7	425	10
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	8	700	7
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	9	450	7
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	10	440	8
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	11	570	8
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	12	580	10
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	13	580	9
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	14	560	9
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	15	645	9
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	16	440	11
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	17	400	10
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	18	305	11
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	19	560	9
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	20	400	9
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	21	380	10
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	22	525	7
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	23	470	7
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	24	1080	5
24.1	Гнойно (150)	26.04.2004	110	25	1020	5
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	1	250	12
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	2	350	10
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	3	470	10
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	4	490	9

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	5	460	9
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	6	600	7
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	7	430	10
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	8	600	7
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	9	200	12
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	10	240	11
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	11	240	11
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	12	500	10
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	13	470	9
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	14	530	9
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	15	650	6
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	16	590	7
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	17	470	11
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	18	580	8
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	19	380	8
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	20	620	9
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	21	580	8
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	22	350	8
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	23	160	12
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	24	650	10
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	25	210	12
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	26	650	9
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	27	465	9
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	28	555	9
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	29	745	7
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	30	620	7
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	31	340	12
24.1	Гнойно (150)	07.07.2004	110	32	570	10
	Стійловий період	03.12.2004		1	160	15
	Стійловий період	03.12.2004		2	1470	5
	Стійловий період	03.12.2004		3	560	10
	Стійловий період	03.12.2004		4	450	11
	Стійловий період	03.12.2004		5	950	7
	Стійловий період	03.12.2004		6	840	7
	Стійловий період	03.12.2004		7	210	11
	Стійловий період	03.12.2004		8	190	13
	Стійловий період	03.12.2004		9	600	8
	Стійловий період	03.12.2004		10	600	8
	Стійловий період	03.12.2004		11	880	6
	Стійловий період	03.12.2004		12	600	6
	Стійловий період	03.12.2004		13	660	7
	Стійловий період	03.12.2004		14	540	9
	Стійловий період	03.12.2004		15	580	9
	Стійловий період	03.12.2004		16	460	11
	Стійловий період	03.12.2004		17	440	10
	Стійловий період	03.12.2004		18	460	11
	Стійловий період	03.12.2004		19	480	7
	Стійловий період	03.12.2004		20	1000	6
	Стійловий період	03.12.2004		21	680	7
	Стійловий період	03.12.2004		22	680	7

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
	Стійловий період	03.12.2004		23	560	8
	Стійловий період	03.12.2004		24	900	5
	Стійловий період	03.12.2004		25	800	6
	Стійловий період	03.12.2004		26	580	10
	Стійловий період	03.12.2004		27	280	12
	Стійловий період	03.12.2004		28	680	9
	Стійловий період	03.12.2004		29	440	9
	Стійловий період	03.12.2004		30	580	10
	Стійловий період	03.12.2004		31	400	11
	Стійловий період	03.12.2004		32	810	8
	Стійловий період	03.12.2004		33	960	7
	Стійловий період	03.12.2004		34	850	7
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	1	731	8
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	2	801	8
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	3	733	9
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	4	801	10
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	5	673	10
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	6	733	9
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	7	918	9
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	8	1078	7
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	9	819	7
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	10	789	6
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	11	722	10
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	12	1234	6
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	13	874	8
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	14	828	8
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	15	383	10
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	16	444	11
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	17	308	13
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	18	486	9
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	19	430	9
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	20	388	8
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	21	450	9
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	22	333	10
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	23	279	10
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	24	561	7
24.1	Гнойно (140)	25.08.2005	110	25	337	7
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	1	400	13
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	2	730	6
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	3	400	10
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	4	480	9
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	5	370	14
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	6	655	11
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	7	570	10
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	8	680	7
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	9	900	5
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	10	450	10
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	11	670	14
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	12	710	10
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	13	530	7

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	14	615	110
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	15	500	10
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	16	360	13
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	17	430	10
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	18	370	12
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	19	430	10
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	20	800	5
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	21	515	11
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	22	850	5
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	23	900	5
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	24	560	8
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	25	590	8
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	26	615	10
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	27	370	11
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	28	760	6
24.1	Гнойно (125)	05.05.2006	105	29	900	4
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	1	1020	7
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	2	1480	8
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	3	940	9
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	4	1700	5
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	5	2000	3
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	6	240	12
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	7	245	11
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	8	135	10
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	9	1050	6
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	10	800	10
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	11	520	12
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	12	800	10
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	13	350	9
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	14	1060	8
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	15	450	12
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	16	320	12
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	17	280	8
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	18	1160	9
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	19	1570	8
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	20	700	7
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	21	290	12
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	22	490	10
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	23	790	10
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	24	490	10
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	25	1390	5
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	26	880	7
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	27	750	8
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	28	910	1
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	29	1080	6
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	30	1190	4
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	31	200	15
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	32	105	20
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	33	160	16
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	34	610	8

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
24.1	Гнойно (125)	21.09.2006	105	35	395	10
24.1	Гнойно (125)	16.05.2007	105	1	520	10
24.1	Гнойно (145)	16.05.2007	105	2	470	10
24.1	Гнойно (145)	16.05.2007	105	3	480	10
24.1	Гнойно (145)	16.05.2007	105	4	485	10
24.1	Гнойно (145)	16.05.2007	105	5	490	10
24.1	Гнойно (145)	16.05.2007	105	6	680	6
24.1	Гнойно (145)	16.05.2007	105	7	480	9
24.1	Гнойно (145)	16.05.2007	105	8	470	8
24.1	Гнойно (145)	16.05.2007	105	9	480	9
24.1	Гнойно (145)	16.05.2007	105	10	665	4
24.2	Омельно (65)	05.05.2005	35	1	370	12
24.2	Омельно (65)	05.05.2005	35	2	480	10
24.2	Омельно (65)	05.05.2005	35	3	530	8
24.2	Омельно (65)	05.05.2005	35	4	400	8
24.2	Омельно (65)	05.05.2005	35	5	400	10
24.2	Омельно (60)	21.09.2006	35	1	240	10
24.2	Омельно (60)	21.09.2006	35	2	390	12
24.2	Омельно (60)	21.09.2006	35	3	140	16
24.2	Омельно (60)	21.09.2006	35	4	200	13
24.2	Омельно (60)	21.09.2006	35	5	305	6
24.2	Омельно (60)	21.09.2006	35	6	265	14
24.2	Омельно (60)	21.09.2006	35	7	370	12
24.2	Омельно (60)	21.09.2006	35	8	180	12
24.2	Омельно (60)	21.09.2006	35	9	335	9
24.2	Омельно (60)	21.09.2006	35	10	85	16
24.2	Омельно (60)	21.09.2006	35	11	210	13
24.2	Омельно (38)	16.05.2007	35	1	130	20
24.2	Омельно (38)	16.05.2007	35	2	160	15
24.2	Омельно (38)	16.05.2007	35	3	190	20
24.2	Омельно (38)	16.05.2007	35	4	90	16
24.2	Омельно (38)	16.05.2007	35	5	120	20
24.2	Омельно (38)	16.05.2007	35	6	130	18
24.2	Омельно (38)	16.05.2007	35	7	260	14
24.2	Омельно (38)	16.05.2007	35	8	310	13
24.2	Омельно (38)	16.05.2007	35	9	130	22
24.2	Омельно (38)	16.05.2007	35	10	260	12
25	с.Заболоття					
25.1	Лисиче (70)	10.06.2004	55	1	190	10
25.1	Лисиче (70)	10.06.2004	55	2	230	9
25.1	Лисиче (70)	10.06.2004	55	3	180	13
25.1	Лисиче (70)	10.06.2004	55	4	180	13
25.1	Лисиче (70)	10.06.2004	55	5	190	12
25.1	Лисиче (70)	10.06.2004	55	6	170	16
25.1	Лисиче (70)	10.06.2004	55	7	290	9
25.1	Лисиче (70)	10.06.2004	55	8	270	9
25.1	Лисиче (70)	10.06.2004	55	9	170	10
25.1	Лисиче (70)	10.06.2004	55	10	260	11
25.1	Лисиче (70)	10.06.2004	55	11	190	12
25.1	Лисиче (85)	07.06.2006	55	1	420	9

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
25.1	Лисиче (85)	07.06.2006	55	2	100	15
25.1	Лисиче (85)	07.06.2006	55	3	320	9
25.1	Лисиче (85)	07.06.2006	55	4	90	15
25.1	Лисиче (85)	07.06.2006	55	5	60	17
25.1	Лисиче (110)	24.06.2008	55	1	170	16
25.1	Лисиче (110)	24.06.2008	55	2	180	11
25.1	Лисиче (110)	24.06.2008	55	3	210	12
25.1	Лисиче (110)	24.06.2008	55	4	185	10
25.1	Лисиче (110)	24.06.2008	55	5	240	12
25.1	Лисиче (110)	24.06.2008	55	6	295	10
25.1	Лисиче (110)	24.06.2008	55	7	310	6
25.1	Лисиче (110)	24.06.2008	55	8	225	8
25.1	Лисиче (110)	24.06.2008	55	9	260	10
25.2	Пляшівка (45)	10.06.2004	20	1	220	12
25.2	Пляшівка (45)	10.06.2004	20	2	230	9
25.2	Пляшівка (45)	10.06.2004	20	3	190	9
25.2	Пляшівка (45)	10.06.2004	20	4	280	10
25.2	Пляшівка (45)	10.06.2004	20	5	300	8
25.2	Пляшівка (45)	10.06.2004	20	6	430	8
25.2	Пляшівка (45)	10.06.2004	20	7	290	11
25.3	В`язівно (35)	07.06.2006	35	1	60	25
25.3	В`язівно (35)	07.06.2006	35	2	90	18
25.3	В`язівно (35)	07.06.2006	35	3	65	20
25.3	В`язівно (35)	07.06.2006	35	4	95	20
25.3	В`язівно (35)	07.06.2006	35	5	65	24
25.3	Левочки (35)	24.06.2008	12	1	310	10
25.3	Левочки (35)	24.06.2008	12	2	190	13
25.3	Левочки (35)	24.06.2008	12	3	360	9
25.3	Левочки (35)	24.06.2008	12	4	175	14
25.3	Левочки (35)	24.06.2008	12	5	140	15
26	с.Залав`є					
26.1	Кобила (30)	25.05.2006	20	1	300	9
26.1	Кобила (30)	25.05.2006	20	2	150	12
26.1	Кобила (30)	25.05.2006	20	3	190	11
26.1	Кобила (30)	25.05.2006	20	4	260	8
26.1	Кобила (30)	25.05.2006	20	5	110	12
26.1	Кобила (30)	25.05.2006	20	6	140	12
26.1	Кобила (26)	27.06.2008	20	1	120	18
26.1	Кобила (26)	27.06.2008	20	2	90	20
26.1	Кобила (26)	27.06.2008	20	3	125	18
26.1	Кобила (26)	27.06.2008	20	4	85	20
26.1	Кобила (26)	27.06.2008	20	5	85	20
26.1	Кобила (26)	27.06.2008	20	6	70	25
26.2	Шманиха (35)	25.05.2006	22	1	100	16
26.2	Шманиха (35)	25.05.2006	22	2	107	18
26.2	Шманиха (35)	25.05.2006	22	3	170	18
26.2	Шманиха (35)	25.05.2006	22	4	90	22
26.2	Шманиха (35)	25.05.2006	22	5	50	25
26.2	Шманиха (35)	25.05.2006	22	6	28	25
26.2	Шманиха (35)	27.06.2008	22	1	25	30

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	¹³⁷ Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	¹³⁷ Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
26.2	Шманиха (35)	27.06.2008	22	2	75	25
26.2	Шманиха (35)	27.06.2008	22	3	22	30
26.2	Шманиха (35)	27.06.2008	22	4	50	20
26.2	Шманиха (35)	27.06.2008	22	5	35	18
26.3	Калин (60)	25.05.2006	26	1	200	9
26.3	Калин (60)	25.05.2006	26	2	200	9
26.3	Калин (60)	25.05.2006	26	3	210	9
26.3	Калин (60)	25.05.2006	26	4	120	12
26.3	Калин (60)	25.05.2006	26	5	110	12
26.3	Калин (45)	27.06.2008	26	1	25	30
26.3	Калин (45)	27.06.2008	26	2	80	15
26.3	Калин (45)	27.06.2008	26	3	60	30
26.3	Калин (45)	27.06.2008	26	4	20	30
26.3	Калин (45)	27.06.2008	26	5	75	20
27	с.Осницьк					
27.1	р.Льва (40)	19.09.2007	15	1	35	18
27.1	р.Льва (40)	19.09.2007	15	2	33	19
27.1	р.Льва (40)	19.09.2007	15	3	25	30
27.1	р.Льва (40)	19.09.2007	15	4	30	20
27.1	р.Льва (40)	19.09.2007	15	5	64	30
27.1	р.Льва (40)	19.09.2007	15	6	40	30
27.1	р.Льва (40)	19.09.2007	15	7	30	30
27.1	р.Льва (40)	19.09.2007	15	8	30	30
27.1	р.Льва (40)	19.09.2007	15	9	35	20
27.1	р.Льва (55)	17.09.2008	15	1	96	23
27.1	р.Льва (55)	17.09.2008	15	2	30	30
27.1	р.Льва (55)	17.09.2008	15	3	50	30
27.1	р.Льва (55)	17.09.2008	15	4	40	30
27.1	р.Льва (55)	17.09.2008	15	5	95	20
27.1	р.Льва (55)	17.09.2008	15	6	65	30
27.1	р.Льва (55)	17.09.2008	15	7	200	15
27.1	р.Льва (55)	17.09.2008	15	8	250	13
27.2	Бродок (45)	19.09.2007	25	1	135	14
27.2	Бродок (45)	19.09.2007	25	2	210	10
27.2	Бродок (45)	19.09.2007	25	3	140	12
27.2	Бродок (45)	19.09.2007	25	4	60	19
27.2	Бродок (45)	19.09.2007	25	5	155	16
27.2	Бродок (45)	19.09.2007	25	6	130	15
27.2	Бродок (45)	19.09.2007	25	7	20	50
27.2	Бродок (45)	19.09.2007	25	8	40	21
27.2	Бродок (45)	19.09.2007	25	9	50	25
27.2	Бродок (35)	17.09.2008	25	1	280	10
27.2	Бродок (35)	17.09.2008	25	2	120	20
27.2	Бродок (35)	17.09.2008	25	3	146	17
27.2	Бродок (35)	17.09.2008	25	4	86	25
27.2	Бродок (35)	17.09.2008	25	5	215	15
27.2	Бродок (35)	17.09.2008	25	6	170	16
27.2	Бродок (35)	17.09.2008	25	7	110	20
27.2	Бродок (35)	17.09.2008	25	8	210	15
27.2	Бродок (35)	17.09.2008	25	9	585	9

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	¹³⁷ Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	¹³⁷ Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
28	<i>с.Переходиці</i>					
28.1	Дубниця (46)	10.06.2004	105	1	270	15
28.1	Дубниця (46)	10.06.2004	105	2	320	13
28.1	Дубниця (46)	10.06.2004	105	3	240	13
28.1	Дубниця (46)	10.06.2004	105	4	240	15
28.1	Дубниця (46)	10.06.2004	105	5	190	16
28.1	Дубниця (46)	10.06.2004	105	6	390	10
28.1	Дубниця (35)	04.07.2007	105	1	120	10
28.1	Дубниця (35)	04.07.2007	105	2	155	16
28.1	Дубниця (35)	04.07.2007	105	3	250	15
28.1	Дубниця (35)	04.07.2007	105	4	180	20
28.1	Дубниця (90)	12.06.2008	90	1	370	6
28.1	Дубниця (90)	12.06.2008	90	2	400	9
28.1	Дубниця (90)	12.06.2008	90	3	280	10
28.1	Дубниця (90)	12.06.2008	90	4	320	8
28.2	Колісець (27)	10.06.2004	70	1	230	11
28.2	Колісець (27)	10.06.2004	70	2	220	12
28.2	Колісець (27)	10.06.2004	70	3	200	11
28.2	Колісець (27)	10.06.2004	70	4	170	16
28.2	Колісець (27)	10.06.2004	70	5	200	15
28.2	Колісець (25)	04.07.2007	65	1	260	12
28.2	Колісець (25)	04.07.2007	65	2	305	14
28.3	Розумова (35)	10.06.2004	60	1	540	10
28.3	Розумова (35)	10.06.2004	60	2	600	9
28.3	Розумова (35)	10.06.2004	60	3	570	9
28.3	Розумова (35)	10.06.2004	60	4	540	11
28.3	Розумова (35)	10.06.2004	60	5	170	13
28.3	Розумова (35)	10.06.2004	60	6	670	7
28.3	Розумова (35)	10.06.2004	60	7	550	7
28.3	Розумова (35)	10.06.2004	60	8	560	8
28.3	Розумова (30)	04.07.2007	60	1	380	13
28.3	Розумова (30)	04.07.2007	60	2	420	13
28.3	Розумова (30)	04.07.2007	60	3	370	10
28.3	Розумова (45)	12.06.2008	60	1	310	9
28.3	Розумова (45)	12.06.2008	60	2	390	7
28.3	Розумова (45)	12.06.2008	60	3	395	5
28.3	Розумова (45)	12.06.2008	60	4	405	6
28.3	Розумова (45)	12.06.2008	60	5	345	10
28.3	Розумова (45)	12.06.2008	60	6	350	8
28.4	Система (70)	10.06.2004	40	1	100	17
28.4	Система (70)	10.06.2004	40	2	100	17
28.4	Система (70)	10.06.2004	40	3	130	15
28.4	Система, Острів (65)	04.07.2007	35	1	65	15
28.4	Система, Острів (65)	04.07.2007	35	2	60	20
28.4	Система, Острів (65)	04.07.2007	35	3	75	16
28.4	Система, Острів (65)	12.06.2008	35	1	20	25
28.4	Система, Острів (65)	12.06.2008	35	2	70	16
28.4	Система, Острів (65)	12.06.2008	35	3	110	9
28.4	Система, Острів (65)	12.06.2008	35	4	75	12
29	<i>с.Старе Село</i>					

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
29.1	Терепча, Гало (100)	10.06.2004	90	1	520	10
29.1	Терепча, Гало (100)	10.06.2004	90	2	430	9
29.1	Терепча, Гало (100)	10.06.2004	90	3	270	9
29.1	Терепча, Гало (100)	10.06.2004	90	4	440	11
29.1	Терепча, Гало (100)	10.06.2004	90	5	550	9
29.1	Терепча, Гало (100)	10.06.2004	90	6	520	7
29.1	Терепча, Гало (100)	10.06.2004	90	7	510	7
29.1	Терепча, Гало (90)	15.06.2006	90	1	290	12
29.1	Терепча, Гало (90)	15.06.2006	90	2	260	12
29.1	Терепча, Гало (90)	05.07.2007	90	1	380	9
29.1	Терепча, Гало (90)	05.07.2007	90	2	340	10
29.1	Терепча, Гало (90)	05.07.2007	90	3	310	7
29.1	Терепча, Гало (120)	30.07.2008	90	1	525	9
29.1	Терепча, Гало (120)	30.07.2008	90	2	365	12
29.1	Терепча, Гало (120)	30.07.2008	90	3	325	12
29.1	Терепча, Гало (120)	30.07.2008	90	4	445	8
29.1	Терепча, Гало (120)	30.07.2008	90	5	470	7
29.2	Лебідь (65)	10.06.2004	100	1	620	7
29.2	Лебідь (85)	15.06.2006	100	1	530	7
29.2	Лебідь (85)	15.06.2006	100	2	1290	5
29.2	Лебідь (85)	15.06.2006	100	3	860	7
29.2	Лебідь (85)	15.06.2006	100	4	830	7
29.2	Лебідь (85)	15.06.2006	100	5	320	11
29.2	Лебідь (85)	15.06.2006	100	6	780	9
29.2	Лебідь (85)	15.06.2006	100	7	340	9
29.2	Лебідь (100)	30.07.2008	95	1	400	10
29.2	Лебідь (100)	30.07.2008	95	2	690	7
29.2	Лебідь (100)	30.07.2008	95	3	350	6
29.2	Лебідь (100)	30.07.2008	95	4	265	11
29.2	Лебідь (100)	30.07.2008	95	5	580	6
29.2	Лебідь (100)	30.07.2008	95	6	560	8
29.2	Лебідь (100)	30.07.2008	95	7	800	7
29.3	Медьоди, Олішон (300)	10.06.2004	20	1	480	10
29.3	Медьоди, Олішон (300)	10.06.2004	20	2	370	11
29.3	Медьоди, Олішон (300)	10.06.2004	20	3	260	13
29.3	Медьоди, Олішон (300)	10.06.2004	20	4	280	13
29.3	Медьоди, Олішон (300)	10.06.2004	20	5	340	10
29.3	Медьоди, Олішон (300)	10.06.2004	20	6	220	12
29.3	Медьоди, Олішон (330)	05.07.2007	20	1	280	12
29.3	Медьоди, Олішон (330)	05.07.2007	20	2	380	9
29.3	Медьоди, Олішон (350)	30.07.2008	22	1	415	10
29.3	Медьоди, Олішон (350)	30.07.2008	22	2	400	11
29.3	Медьоди, Олішон (350)	30.07.2008	22	3	450	9
29.3	Медьоди, Олішон (350)	30.07.2008	22	4	350	12
29.3	Медьоди, Олішон (350)	30.07.2008	22	5	355	13
29.3	Медьоди, Олішон (350)	30.07.2008	22	6	395	8
29.4	Серендров (150)	10.06.2004	25	1	210	9
29.4	Серендров (150)	10.06.2004	25	2	280	11
29.4	Серендров (150)	10.06.2004	25	3	240	12
29.4	Серендров (150)	10.06.2004	25	4	250	11

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	¹³⁷ Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	¹³⁷ Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
29.4	Серендров (150)	10.06.2004	25	5	200	11
29.4	Серендров (150)	10.06.2004	25	6	480	8
29.4	Серендров (135)	15.06.2006	25	1	160	15
29.4	Серендров (135)	15.06.2006	25	2	220	11
29.4	Серендров (135)	15.06.2006	25	3	195	18
29.4	Серендров (135)	15.06.2006	25	4	830	9
29.4	Серендров (135)	15.06.2006	25	5	570	11
29.4	Серендров (135)	15.06.2006	25	6	270	15
29.4	Серендров (135)	15.06.2006	25	7	230	12
29.4	Серендров (135)	15.06.2006	25	8	240	12
29.4	Серендров (140)	05.07.2007	25	1	190	16
29.4	Серендров (140)	05.07.2007	25	2	200	9
29.4	Серендров (140)	05.07.2007	25	3	500	7
29.4	Серендров (140)	05.07.2007	25	4	290	7
29.4	Серендров (140)	05.07.2007	25	5	350	11
29.4	Серендров (140)	05.07.2007	25	6	475	8
29.4	Серендров (140)	05.07.2007	25	7	200	12
29.4	Серендров (140)	05.07.2007	25	8	320	9
29.4	Серендров (100)	30.07.2008	25	1	220	10
29.4	Серендров (100)	30.07.2008	25	2	370	12
29.4	Серендров (100)	30.07.2008	25	3	385	8
29.4	Серендров (100)	30.07.2008	25	4	380	11
29.4	Серендров (100)	30.07.2008	25	5	325	10
29.4	Серендров (100)	30.07.2008	25	6	360	12
29.4	Серендров (100)	30.07.2008	25	7	230	15
29.5	Вороняче (90)	10.06.2004	40	1	440	7
29.5	Вороняче (110)	15.06.2006	40	1	365	10
29.5	Вороняче (110)	15.06.2006	40	2	540	7
29.5	Вороняче (110)	15.06.2006	40	3	180	12
29.5	Вороняче (110)	15.06.2006	40	4	350	9
29.5	Вороняче (110)	15.06.2006	40	5	410	9
29.5	Вороняче (110)	15.06.2006	40	6	650	7
29.5	Вороняче (120)	05.07.2007	40	1	430	8
29.5	Вороняче (120)	05.07.2007	40	2	490	8
29.5	Вороняче (120)	05.07.2007	40	3	880	6
29.5	Вороняче (140)	30.07.2008	45	1	500	7
29.5	Вороняче (140)	30.07.2008	45	2	415	10
29.5	Вороняче (140)	30.07.2008	45	3	425	10
29.5	Вороняче (140)	30.07.2008	45	4	560	5
29.5	Вороняче (140)	30.07.2008	45	5	515	6
29.5	Вороняче (140)	30.07.2008	45	6	650	8
29.5	Вороняче (140)	30.07.2008	45	7	740	7
29.6	Чистець (150)	10.06.2004	35	1	590	11
29.6	Чистець (150)	10.06.2004	35	2	610	9
29.6	Чистець (150)	10.06.2004	35	3	570	11
29.6	Чистець (150)	15.06.2006	35	1	505	8
29.6	Чистець (150)	15.06.2006	35	2	375	10
29.6	Чистець (150)	15.06.2006	35	3	280	12

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
29.6	Чистець (150)	15.06.2006	35	4	180	16
29.6	Чистець (150)	15.06.2006	35	5	410	10
30.6	Чистець (150)	15.06.2006	35	6	450	9
30	смт. Томашгород					
30.1	Ломське (25)	15.05.2007	45	1	44	26
30.1	Ломське (25)	15.05.2007	45	2	44	25
30.1	Ломське (25)	15.05.2007	45	3	63	25
30.1	Ломське (25)	15.05.2007	45	4	65	28
30.1	Ломське (25)	15.05.2007	45	5	75	24
30.1	Ломське (25)	15.05.2007	45	6	60	26
30.1	Ломське (25)	15.05.2007	45	7	40	25
30.1	Ломське (25)	16.09.2008	40	1	72	13
30.1	Ломське (25)	16.09.2008	40	2	160	18
30.1	Ломське (25)	16.09.2008	40	3	170	17
30.1	Ломське (25)	16.09.2008	40	4	80	25
30.1	Ломське (25)	16.09.2008	40	5	74	25
30.1	Ломське (25)	16.09.2008	40	6	51	21
30.2	Колодинець (20)	15.05.2007	55	1	370	24
30.2	Колодинець (20)	15.05.2007	55	2	275	14
30.2	Колодинець (20)	15.05.2007	55	3	260	10
30.2	Колодинець (15)	16.09.2008	55	1	110	24
30.2	Колодинець (20)	16.09.2008	55	2	270	15
30.2	Колодинець (20)	16.09.2008	55	3	80	25
30.2	Колодинець (20)	16.09.2008	55	4	170	17
30.3	Крута Слобода (55)	15.05.2007	70	1	135	11
30.3	Крута Слобода (55)	15.05.2007	70	2	160	12
30.3	Крута Слобода (55)	15.05.2007	70	3	220	8
30.3	Крута Слобода (32)	16.09.2008	70	1	55	30
30.3	Крута Слобода (32)	16.09.2008	70	2	110	20
30.3	Крута Слобода (32)	16.09.2008	70	3	120	20
30.3	Крута Слобода (32)	16.09.2008	70	4	245	12
30.3	Крута Слобода (32)	16.09.2008	70	5	75	30
30.3	Крута Слобода (32)	16.09.2008	70	6	145	13
30.4	Віткове (30)	15.05.2007	35	1	58	21
30.4	Віткове (30)	15.05.2007	35	2	160	15
30.4	Віткове (30)	15.05.2007	35	3	160	16
30.4	Віткове (30)	15.05.2007	35	4	200	15
30.4	Віткове (30)	15.05.2007	35	5	110	24
30.4	Віткове (30)	15.05.2007	35	6	220	16
30.4	Віткове (30)	15.05.2007	35	7	115	18
30.4	Віткове (10)	16.09.2008	35	1	195	15
30.4	Віткове (10)	16.09.2008	35	2	370	10
30.4	Віткове (10)	16.09.2008	35	3	170	19
30.4	Віткове (10)	16.09.2008	35	4	380	10
30.4	Віткове (10)	16.09.2008	35	5	155	18
31	с. Томашгород (Сехи)					
31.1	Льва(Кодак) (90)	17.05.2007	17	1	100	20

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	¹³⁷ Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	¹³⁷ Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
31.1	Льва(Кодак) (90)	17.05.2007	17	2	100	20
31.1	Льва(Кодак) (90)	17.05.2007	17	3	120	14
31.1	Льва(Кодак) (90)	17.05.2007	17	4	100	20
31.1	Льва(Кодак) (90)	17.05.2007	17	5	80	22
31.1	Льва(Кодак) (90)	17.05.2007	17	6	80	25
31.1	Льва(Кодак) (90)	17.05.2007	17	7	90	20
31.1	Льва(Кодак) (90)	17.05.2007	17	8	45	30
31.1	Льва(Кодак) (90)	17.05.2007	17	9	60	25
31.1	Льва(Кодак) (90)	17.05.2007	17	10	70	27
31.1	Льва(Кодак) (90)	17.05.2007	17	11	80	25
31.1	Льва(Кодак) (90)	17.05.2007	17	12	30	30
31.2	Льва сіянка (120)	17.05.2007	23	1	40	30
31.2	Льва сіянка (120)	17.05.2007	23	2	45	30
31.2	Льва сіянка (120)	17.05.2007	23	3	35	30
31.2	Льва сіянка (120)	17.05.2007	23	4	30	30
31.2	Льва сіянка (120)	17.05.2007	23	5	6	50
31.2	Льва сіянка (120)	17.05.2007	23	6	7	50
31.2	Льва сіянка (120)	17.05.2007	23	7	5	50
31.2	Льва сіянка (120)	17.05.2007	23	8	30	30
31.2	Льва сіянка (120)	17.05.2007	23	9	25	20
31.2	Льва сіянка (120)	17.05.2007	23	10	30	35
32	с.Хміль					
	Стійловий період	05.12.2004		1	410	9
	Стійловий період	05.12.2004		2	175	12
	Стійловий період	05.12.2004		3	308	10
	Стійловий період	05.12.2004		4	570	8
	Стійловий період	05.12.2004		5	208	11
	Стійловий період	05.12.2004		6	40	25
	Стійловий період	05.12.2004		7	185	12
	Стійловий період	05.12.2004		8	82	20
	Стійловий період	05.12.2004		9	440	9
	Стійловий період	05.12.2004		10	111	15
	Стійловий період	05.12.2004		11	212	11
32.1	Крушинов (65)	17.10.2007	30	1	223	6
32.1	Крушинов (65)	17.10.2007	30	2	165	12
32.1	Крушинов (65)	17.10.2007	30	3	245	9
32.1	Крушинов (65)	17.10.2007	30	4	166	12
32.1	Крушинов (65)	17.10.2007	30	5	370	10
32.1	Крушинов (65)	17.10.2007	30	6	330	13
32.1	Крушинов (70)	27.06.2008	30	1	335	9
32.1	Крушинов (70)	27.06.2008	30	2	240	14
32.1	Крушинов (70)	27.06.2008	30	3	180	15
32.1	Крушинов (70)	27.06.2008	30	4	175	12
32.1	Крушинов (70)	27.06.2008	30	5	250	10
32.2	Ріка (90)	17.10.2007	15	1	80	18
32.2	Ріка (90)	17.10.2007	15	2	64	25
32.2	Ріка (90)	17.10.2007	15	3	167	13
32.2	Ріка (90)	17.10.2007	15	4	130	20

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
32.2	Ріка (90)	17.10.2007	15	5	65	23
32.2	Ріка (90)	17.10.2007	15	6	88	20
32.2	Ріка (90)	17.10.2007	15	7	120	24
32.2	Ріка (90)	17.10.2007	15	8	100	18
32.2	Ріка (90)	17.10.2007	15	9	50	12
32.2	Ріка (90)	17.10.2007	15	10	66	20
32.2	Ріка (90)	27.06.2008	15	1	97	19
32.2	Ріка (90)	27.06.2008	15	2	175	10
32.2	Ріка (90)	27.06.2008	15	3	300	10
32.2	Ріка (90)	27.06.2008	15	4	130	18
32.2	Ріка (90)	27.06.2008	15	5	175	12
32.2	Ріка (90)	27.06.2008	15	6	117	17
32.3	Лакізи (60)	17.10.2007	15	1	200	15
32.3	Лакізи (60)	17.10.2007	15	2	230	15
32.3	Лакізи (60)	27.06.2008	15	1	92	20
32.3	Лакізи (60)	27.06.2008	15	2	120	18
32.3	Лакізи (60)	27.06.2008	15	3	112	16
32.3	Лакізи (60)	27.06.2008	15	4	100	18
Сарненський район. Рівненська область						
33	с.Карпилівка					
33.1	Луг (280)	15.06.2006	34	1	15	25
33.1	Луг (280)	15.06.2006	34	2	10	30
33.1	Луг (280)	15.06.2006	34	3	60	20
33.1	Луг (280)	15.06.2006	34	4	30	25
33.1	Луг (280)	15.06.2006	34	5	50	20
33.1	Луг (280)	15.06.2006	34	6	40	22
33.1	Луг (280)	15.06.2006	34	7	25	26
33.1	Луг (280)	15.06.2006	65	8	270	12
33.2	Отбой (23)	15.06.2006	65	1	175	16
33.2	Отбой (23)	15.06.2006	65	2	180	13
33.2	Отбой (23)	15.06.2006	65	3	290	9
33.2	Отбой (23)	15.06.2006	65	4	280	11
33.2	Отбой (23)	15.06.2006	65	5	225	11
33.2	Отбой (23)	15.06.2006	65	6	245	10
33.2	Отбой (23)	15.06.2006	65	7	160	15
33.2	Отбой (23)	15.06.2006	65	8	250	8
33.2	Отбой (23)	15.06.2006	65	9	200	9
34	с.Клесів					
34.1	Мостище (35)	27.04.2004	20	1	450	9
34.1	Мостище (35)	27.04.2004	20	2	620	9
34.1	Мостище (35)	27.04.2004	20	3	315	10
34.1	Мостище (35)	27.04.2004	20	4	310	12
34.1	Мостище (35)	27.04.2004	20	5	370	12
34.1	Мостище (35)	27.04.2004	20	6	560	8
34.1	Мостище (35)	27.04.2004	20	7	400	7
34.1	Мостище (35)	27.04.2004	20	8	320	11
34.1	Мостище (28)	09.08.2006	25	1	260	10

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
34.1	Мостище (28)	09.08.2006	25	2	250	12
34.1	Мостище (28)	09.08.2006	25	3	310	12
34.1	Мостище (28)	09.08.2006	25	4	330	9
34.1	Мостище (28)	09.08.2006	25	5	250	8
34.1	Мостище (28)	09.08.2006	25	6	270	8
34.1	Мостище (14)	13.06.2007	20	1	440	12
34.1	Мостище (14)	13.06.2007	20	2	290	14
34.1	Мостище (14)	13.06.2007	20	3	330	12
34.1	Мостище (14)	13.06.2007	20	4	190	18
34.1	Мостище (14)	13.06.2007	20	5	230	16
34.1	Мостище (10)	16.09.2008	20	1	85	17
34.1	Мостище (10)	16.09.2008	20	2	300	14
34.1	Мостище (10)	16.09.2008	20	3	380	10
34.1	Мостище (10)	16.09.2008	20	4	195	14
34.1	Мостище (10)	16.09.2008	20	5	320	10
34.2	Баньки (25)	27.04.2004	65	1	80	18
34.2	Баньки (25)	27.04.2004	65	2	200	11
34.2	Баньки (25)	27.04.2004	65	3	230	10
34.2	Баньки (25)	27.04.2004	65	4	470	9
34.2	Баньки (25)	27.04.2004	65	5	440	9
34.2	Баньки (18)	09.08.2006	65	1	400	12
34.2	Баньки (18)	09.08.2006	65	2	190	16
34.2	Баньки (18)	09.08.2006	65	3	400	9
34.2	Баньки (18)	09.08.2006	65	4	340	10
34.2	Баньки (18)	09.08.2006	65	5	170	12
34.2	Баньки (15)	13.06.2007	60	1	260	15
34.2	Баньки (15)	13.06.2007	60	2	175	18
34.2	Баньки (15)	13.06.2007	60	3	130	30
34.2	Баньки (15)	13.06.2007	60	4	210	19
34.2	Баньки (15)	13.06.2007	60	5	270	16
34.2	Баньки (15)	13.06.2007	60	6	160	19
34.2	Баньки (15)	13.06.2007	60	7	240	16
34.2	Баньки (15)	16.09.2008	60	1	190	18
34.2	Баньки (15)	16.09.2008	60	2	260	15
34.2	Баньки (15)	16.09.2008	60	3	230	15
34.2	Баньки (15)	16.09.2008	60	4	455	10
34.2	Баньки (15)	16.09.2008	60	5	280	11
35	<i>с.Пугач</i>					
35.1	Кремно (л. стор) (12)	27.04.2004	60	1	180	12
35.1	Кремно (л. стор) (12)	27.04.2004	60	2	260	9
35.1	Кремно (л. стор) (12)	27.04.2004	60	3	180	11
35.1	Кремно (л. стор) (12)	27.04.2004	60	4	210	11
35.2	Кремно (пр. стор) (18)	27.04.2004	60	1	120	16
35.2	Кремно (пр. стор) (18)	27.04.2004	45	2	130	15
35.2	Кремно (пр. стор) (18)	27.04.2004	45	3	90	20
35.2	Кремно (пр. стор) (18)	27.04.2004	45	4	60	22
35.2	Кремно (пр. стор) (18)	27.04.2004	45	5	460	10

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
35.2	Кремно (пр. стор) (18)	27.04.2004	45	6	470	9
35.2	Кремно (пр. стор) (18)	27.04.2004	45	7	140	14
35.2	Кремно (пр. стор) (18)	27.04.2004	45	8	140	16
35.2	Кремно (16)	10.08.2006	45	1	100	8
35.2	Кремно (16)	10.08.2006	45	2	95	8
35.2	Кремно (16)	10.08.2006	45	3	440	4
35.2	Кремно (16)	10.08.2006	45	4	280	5
35.2	Кремно (16)	10.08.2006	45	5	290	6
35.2	Кремно (16)	10.08.2006	45	6	185	5
35.2	Кремно (16)	10.08.2006	45	7	260	5
35.2	Кремно (16)	10.08.2006	45	8	390	3
35.2	Кремно (16)	10.08.2006	45	9	400	3
35.2	Кремно (16)	10.08.2006	45	10	215	4
35.2	Кремно (16)	10.08.2006	45	11	280	5
35.2	Кремно (16)	10.08.2006	45	12	250	3
35.2	Кремно (24)	12.06.2007	40	1	204	10
35.2	Кремно (24)	12.06.2007	40	2	55	24
35.2	Кремно (24)	12.06.2007	40	3	35	28
35.2	Кремно (24)	12.06.2007	40	4	20	30
35.2	Кремно (24)	12.06.2007	40	5	155	10
35.2	Кремно (24)	12.06.2007	40	6	65	20
35.2	Кремно (24)	12.06.2007	40	7	160	10
35.2	Кремно (24)	12.06.2007	40	8	90	14
35.2	Кремно (24)	12.06.2007	40	9	50	21
35.2	Кремно (22)	15.09.2008	35	1	290	15
35.2	Кремно (24)	15.09.2008	35	2	400	10
35.2	Кремно (24)	15.09.2008	35	3	350	10
35.2	Кремно (24)	15.09.2008	35	4	220	17
35.2	Кремно (24)	15.09.2008	35	5	320	14
35.2	Кремно (24)	15.09.2008	35	6	260	16
35.2	Кремно (24)	15.09.2008	35	7	260	14
36	<i>с.Рудня Карпилівська</i>					
36.1	Став (45)	28.04.2004	50	1	125	12
36.1	Став (45)	28.04.2004	50	2	100	14
36.1	Став (45)	28.04.2004	50	3	280	9
36.1	Став (45)	28.04.2004	50	4	260	9
36.1	Став (45)	28.04.2004	50	5	145	12
36.1	Став (45)	28.04.2004	50	6	500	8
36.1	Став (45)	28.04.2004	50	7	130	12
36.1	Став (45)	07.07.2006	50	1	110	4
36.1	Став (45)	07.07.2006	50	2	140	6
36.1	Став (45)	07.07.2006	50	3	70	8
36.1	Став (45)	07.07.2006	50	4	80	10
36.1	Став (45)	07.07.2006	50	5	80	12
36.1	Став (50)	05.06.2007	55	1	50	30
36.1	Став (50)	05.06.2007	55	2	95	25
36.1	Став (50)	05.06.2007	55	3	85	25

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
36.1	Став (50)	05.06.2007	55	4	20	50
36.1	Став (50)	05.06.2007	55	5	85	30
36.2	Кружок, Болото (50)	28.04.2004	25	1	560	9
36.2	Кружок, Болото (50)	28.04.2004	25	2	490	9
36.2	Кружок, Болото (50)	28.04.2004	25	3	1340	6
36.2	Кружок, Болото (50)	28.04.2004	25	4	230	11
36.2	Кружок, Болото (50)	28.04.2004	25	5	260	10
36.2	Кружок, Болото (50)	28.04.2004	25	6	210	11
36.2	Кружок, Болото (50)	28.04.2004	25	7	130	14
36.2	Кружок, Болото (50)	28.04.2004	25	8	335	9
36.2	Кружок, Болото (45)	07.07.2006	30	1	430	4
36.2	Кружок, Болото (45)	07.07.2006	30	2	250	6
36.2	Кружок, Болото (45)	07.07.2006	30	3	210	5
36.2	Кружок, Болото (45)	07.07.2006	30	4	860	2
36.2	Кружок, Болото (45)	07.07.2006	30	5	100	7
36.2	Кружок, Болото (45)	07.07.2006	30	6	100	5
36.2	Кружок, Болото (45)	07.07.2006	30	7	620	3
36.2	Кружок, Болото (40)	05.06.2007	30	1	90	20
36.2	Кружок, Болото (40)	05.06.2007	30	2	80	25
36.2	Кружок, Болото (40)	05.06.2007	30	3	80	25
36.2	Кружок, Болото (40)	05.06.2007	30	4	70	30
36.2	Кружок, Болото (40)	05.06.2007	30	5	100	20
36.2	Кружок, Болото (40)	05.06.2007	30	6	90	24
37	<i>с. Федорівка</i>					
37.1	Волосень (12)	14.06.2007	80	1	110	25
37.1	Волосень (12)	14.06.2007	80	2	120	25
37.1	Волосень (12)	14.06.2007	80	3	130	15
37.1	Волосень (12)	14.06.2007	80	4	110	20
37.1	Волосень (12)	14.06.2007	80	5	100	25
37.1	Волосень (15)	17.09.2008	80	1	98	10
37.1	Волосень (15)	17.09.2008	80	2	112	20
37.1	Волосень (15)	17.09.2008	80	3	90	12
37.1	Волосень (15)	17.09.2008	80	4	105	13
37.1	Волосень (15)	17.09.2008	80	5	80	14
37.1	Волосень (15)	17.09.2008	80	6	80	16
37.1	Волосень (15)	17.09.2008	80	7	75	20
37.2	За кладовищем (55)	14.06.2007	45	1	20	50
37.2	За кладовищем (55)	14.06.2007	45	2	10	50
37.2	За кладовищем (55)	14.06.2007	45	3	75	29
37.2	За кладовищем (55)	14.06.2007	45	4	20	50
37.2	За кладовищем (55)	14.06.2007	45	5	30	30
37.2	За кладовищем (55)	14.06.2007	45	6	15	50
37.2	За кладовищем (55)	14.06.2007	45	7	20	50
37.2	За кладовищем (55)	14.06.2007	45	8	10	50
37.2	За кладовищем (55)	14.06.2007	45	9	60	22
37.3	Міжпоросля (18)	14.06.2007	50	1	20	50
37.3	Міжпоросля (18)	14.06.2007	50	2	10	50

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	¹³⁷ Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	¹³⁷ Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
37.3	Міжпоросля (18)	14.06.2007	50	3	25	30
Маневицький район. Волинська область						
38	с.Галузії					
38.1	Засернюха, Ячиння (45)	11.07.2004	35	1	80	15
38.1	Засернюха, Ячиння (45)	11.07.2004	35	2	65	20
38.1	Засернюха, Ячиння (45)	11.07.2004	35	3	130	14
38.1	Засернюха, Ячиння (45)	11.07.2004	35	4	100	14
38.1	Засернюха, Ячиння (45)	18.07.2007	35	1	110	17
38.1	Засернюха, Ячиння (25)	18.07.2007	35	2	130	14
38.1	Засернюха, Ячиння (25)	18.07.2007	35	3	75	20
38.1	Засернюха, Ячиння (25)	18.07.2007	35	4	80	17
38.1	Засернюха, Ячиння (25)	18.07.2007	35	5	85	18
38.1	Засернюха, Ячиння (25)	18.07.2007	35	6	55	25
38.2	Оптова (20)	11.07.2004	25	1	40	20
38.2	Оптова (20)	11.07.2004	25	2	40	25
38.2	Оптова (20)	11.07.2004	25	3	60	18
38.2	Оптова (20)	11.07.2004	25	4	30	30
38.2	Оптова (20)	11.07.2004	25	5	45	16
38.2	Оптова (18)	22.09.2006	25	1	105	13
38.2	Оптова (18)	22.09.2006	25	2	90	18
38.2	Оптова (18)	22.09.2006	25	3	120	12
38.2	Оптова (18)	22.09.2006	25	4	95	15
38.2	Оптова (18)	22.09.2006	25	5	98	15
38.2	Оптова (18)	22.09.2006	25	6	80	16
38.2	Оптова (18)	22.09.2006	25	7	100	13
38.2	Оптова (18)	22.09.2006	25	8	25	17
38.2	Оптова (15)	22.09.2006	25	9	70	16
38.2	Оптова (15)	18.07.2007	25	1	130	10
38.2	Оптова (15)	18.07.2007	25	2	125	12
38.2	Оптова (15)	18.07.2007	25	3	135	10
38.2	Оптова (15)	18.07.2007	25	4	110	10
38.3	Кривенська (50)	11.07.2004	25	1	35	26
38.3	Кривенська (50)	11.07.2004	25	2	40	18
38.3	Кривенська (50)	11.07.2004	25	3	40	18
38.3	Кривенська (50)	11.07.2004	25	4	35	20
38.4	Став (60)	11.07.2004	30	1	35	18
38.4	Став (60)	11.07.2004	30	2	50	18
38.4	Став (60)	11.07.2004	30	3	20	25
38.4	Став (60)	11.07.2004	30	4	15	33
38.4	Став (60)	11.07.2004	30	5	15	30
38.4	Став (60)	11.07.2004	30	6	20	26
38.4	Став (60)	11.07.2004	30	7	20	26
38.4	Став, Голя (45)	22.09.2006	30	1	40	20
38.4	Став, Голя (45)	22.09.2006	30	2	45	20
38.4	Став, Голя (45)	22.09.2006	30	3	50	16
38.4	Став, Голя (45)	22.09.2006	30	4	60	16
38.4	Став, Голя (45)	22.09.2006	30	5	55	20

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м ²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
38.4	Став, Голя (60)	18.07.2007	30	1	45	24
38.4	Став, Голя (60)	18.07.2007	30	2	40	20
38.4	Став, Голя (60)	18.07.2007	30	3	40	20
38.4	Став, Голя (60)	18.07.2007	30	4	35	25
38.4	Став, Голя (60)	18.07.2007	30	5	18	24
38.4	Став, Голя (60)	18.07.2007	30	6	22	24
38.4	Став, Голя (60)	18.07.2007	30	7	25	29
38.5	Чоботи (25)	22.09.2006	20	1	60	20
38.5	Чоботи (25)	22.09.2006	20	2	35	25
38.5	Чоботи (25)	22.09.2006	20	3	55	25
38.5	Чоботи (25)	22.09.2006	20	4	40	19
38.6	Пастовень (20)	18.07.2007	25	1	24	25
38.6	Пастовень (20)	18.07.2007	25	2	30	20
38.6	Пастовень (20)	18.07.2007	25	3	33	18
39	с.Серхів					
39.1	Садок (15)	10.07.2004	85	1	60	22
39.1	Садок (15)	10.07.2004	85	2	50	16
39.1	Садок (15)	10.07.2004	85	3	60	16
39.1	Садок (15)	10.07.2004	85	4	220	10
39.1	Садок (15)	10.07.2004	85	5	200	12
39.1	Садок (15)	10.07.2004	85	6	180	14
39.1	Садок (15)	10.07.2004	85	7	150	13
39.1	Садок (18)	18.07.2007	85	1	315	11
39.1	Садок (18)	18.07.2007	85	2	310	10
39.1	Садок (18)	18.07.2007	85	3	260	15
39.1	Садок (18)	18.07.2007	85	4	160	10
39.2	Сорока (50)	10.07.2004	25	1	45	18
39.2	Садок (18)	10.07.2004	25	2	50	19
39.2	Садок (18)	10.07.2004	25	3	30	20
39.2	Сорока, Копань (40)	18.07.2007	25	1	70	16
39.2	Сорока, Копань (40)	18.07.2007	25	2	65	18
39.2	Сорока, Копань (40)	18.07.2007	25	3	65	18
39.2	Сорока, Копань (40)	18.07.2007	25	4	60	10
39.2	Сорока, Копань (40)	18.07.2007	25	5	80	14
39.2	Сорока, Копань (40)	18.07.2007	25	6	70	15
39.2	Сорока, Копань (40)	18.07.2007	25	7	85	15
39.2	Сорока, Копань (40)	18.07.2007	25	8	80	18
39.3	Засвіття (65)	10.07.2004	30	1	40	22
39.3	Засвіття (65)	10.07.2004	30	2	50	20
39.3	Засвіття (65)	10.07.2004	30	3	40	20
39.3	Засвіття (75)	18.07.2007	30	1	43	25
39.3	Засвіття (75)	18.07.2007	30	2	35	20
39.3	Засвіття (75)	18.07.2007	30	3	35	25
39.3	Засвіття (75)	18.07.2007	30	4	40	15
39.3	Засвіття (75)	18.07.2007	30	5	40	18
39.4	Вісоч (60)	10.07.2004	24	1	120	12
39.4	Вісоч (60)	10.07.2004	24	2	110	14

№№	Назва урочища, пасовища, сіножаті (кількість корів)	Дата обстеження	^{137}Cs у грунті, кБк/м²	№№ про- би молока господаря	^{137}Cs у молоці, Бк/л	Похибка, Бк/л
39.4	Вісоч (60)	10.07.2004	24	3	70	20
39.4	Вісоч (60)	10.07.2004	24	4	110	11
39.4	Вісоч (60)	18.07.2007	24	1	80	14
39.4	Вісоч (60)	18.07.2007	24	2	75	15
39.4	Вісоч (60)	18.07.2007	24	3	80	15

Стислий опис пасовищ та урочищ

Рівненська область Володимирецький район с. Городок

Випаси: урочище Зачимир`я та Система

Населений пункт забезпечений потенційними пасовищами та територіями для їх створення. Частина худоби випасається по заболоченому лісовому масиву, інша – на перелогах.

урочище Зачимир`я

Природні угіддя в вигляді лісового масиву розташовані на захід від села. Угіддя не мають окреслених контурів. Територія на якій випасається худоба становить близько 120 га. Типовий ландшафт соснових насаджень. Лісові галявини та вирубки вкриті чагарниками, різні за площами вкраплення ділянки боліт - є основними випасами для ВРХ. Худоба випасається прогоном, без прив'язки до певного місця на значній території.

Відкриті ділянки можна охарактеризувати як сухі злаково-різнотравні угіддя на слаборозвинених піщаних ґрунтах і не задернованих пісках. Корм низької якості. Врожайність 3-5 ц/га сіна. Заходи щодо поліпшення малоефективні. Заболочених ділянок багато, особливо подалі від села на захід, де вони поступово збільшуючись за площами утворюють суцільне не прохідне болото. Болотисті ділянки характеризуються як сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на мулуватоболотних та торф'яноболотних ґрунтах. Фітоценотичний тип рослинності переважно різнотравно-чорноосокові. Урожайність до 12 ц/га сіна, низької якості.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 15 кБк/м², забруднення рослинності 840 Бк/кг, середнє забруднення молока - 206 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах

Докорінне покращення угіддя не можливе.

пасовище Система

Пасовище починається за східною околицею і тягнеться на південь на відстань до 2 кілометрів вздовж меліоративного каналу з обох його боків. Угіддя має чіткі контури і площу близько 60 га. Воно розташоване на полях сільськогосподарського призначення, які виведені з обороту.

Угіддя характеризується як вологі злаково-різнотравні луки на осушених торфовищах. Фітоценотичний тип рослинності - різні види сіяних еумезофітних травостоїв. Вони потенційно найбільш родючі, придатні для створення довгострокових сіяних лукопасовищних угідь. Врожайність не поліпшених лук до 15-20 ц/га. Територія поступово заболочується, особливо південна частина випасу (до 15% території). Ґрунти переважно торф'яні. Режим зволоження задовільний. Рослинність середньо продуктивна, одноманітна. В посушливі періоди низькоросла, вибивається худобою до дернини.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 20 кБк/м², забруднення рослинності 460 Бк/кг. Середній вміст ^{137}Cs у молоці 154 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів і створення довгострокового високоврожайного пасовища.

с. Журавлине

Випаси: урочище Гринькове, Густе та Гукове

Населений пункт має одне низькоякісне пасовище, що не задовольняє потребам населення. Основна маса ВРХ випасається в лісових масивах. Територія для створення пасовищ навколо села є в достатній кількості.

урочища Гринькове, Густе

Природні угіддя, що використовуються під випас, у вигляді заболочених мішаних лісових масивів з вкрапленнями низинних лук на галявинах та блюдцями боліт в пониженнях рельєфу розташовані на півночі від села. Угіддя мають аналогічні характеристики і відрізняються тільки географічним положенням відносно населеного пункту. На північний-захід знаходиться Гринькове, на північний-схід – Густе. Територія випасів не визначена, бо худоба заходить в лісові масиви на кілька кілометрів.

Серед лісу трапляються типи угідь: нормально та тимчасово підвищено-зволожені злаково-різнотравні луки на дернових і дерново-підзолистих глеювато-піщаних ґрунтах (врожайність до 7 ц/га середньої якості); сухі і свіжі злакові чи бобово-різнотравно-злакові луки на дернових, дерново-підзолистих і лісових сірих супіщаних та суглинкових ґрунтах (сіножаті та пасовища задовільної та доброї якості, врожайність 12-15 ц/га); тимчасово надмірно зволожені луки на дерново-підзолистих в дернових супіщаних ґрунтах (до 10 ц/га сіна задовільної якості), заболочені ділянки низинних лук на мулувато-болотних та торф'яно-болотних ґрунтах (до 12 ц/га сіна низької якості). Серед фітоценотичного типу переважають різні види тонкомітлицевих, пирійних та Білоусових угруповань. Перечисленні вище типи угідь зустрічаються серед лісового масиву у вигляді мозаїчних утворень.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 50 кБк/м², забруднення рослинності 2000 Бк/кг. Середній вміст ^{137}Cs у молоці - 238 та 296 Бк/л відповідно для обох випасів. Перевищення ДР 2006 відмічено в усіх пробах.

Докорінне поліпшення неможливе.

пасовище Гукове

Пасовище розташоване сході від села на перелогах, виведених з обороту сільськогосподарських полів місцевого колгоспу. Має чіткі межі і площу до 25 га. Переоране в 2002 році. Малопродуктивне з рідким травостоєм. В посушливі періоди вибивається тваринами до ґрунту.

Угіддя характеризується як сухі та помірно сухі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених дернових, дерново-підзолистих піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах. Пасовища з врожайністю 5 - 8 ц/га сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності – тонокомітлицеві та пирійно-тонкомітлицеві.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 30 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 450 Бк/кг, молока - 73 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Поліпшення угіддя можливе шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів. Потенційно можливе створення довгострокового пасовища.

Дубровицький район **с. Будимля**

Випаси: Переходицька система, Озерецька система, Годомля, Лесца, Токовище, Розсоха, Люте, Підніжинка.

Населений пункт має декілька випасів розташованих на перелогах, полях меліоративних систем, та ще кілька природних угідь, що використовуються під випаси. Загалом випасами худоба населення забезпечена, але деякі череди випасаються на болотах де вміст ^{137}Cs у молоці перевищує норматив.

пасовище Переходицька система.

Випаси на колишніх сільськогосподарських угіддях розташовані за рікою Льва на відстані 200-300 метрів від східної околиці села в напрямку населеного пункту Переходичі. Складаються з кількох ділянок перелогів розділених каналами. Загальна площа випасу коливається в межах 40 га (це пов'язано з кількістю розораних населенням під городи ділянок території випасу, які рік від року змінюються).

Угіддя характеризується як сухі та помірно сухі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених дернових, дерново-підзолистих піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах. Пасовища з врожайністю до 12 ц/га сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності - пирійно-тонкомітлицеві. Режим зволоження помірний, задовільний. Травостій густий, продуктивний при достатньому зволоженні. Висота пасовищної рослинності на момент обстеження становила 10-15 сантиметрів. В засушливі періоди травостій вибивається тваринами до дернини.

Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані, місцями трапляються локальні вклинення торф'яників (в низовинах).

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 75 кБк/м², забруднення рослинності 1280 Бк/кг. Середній вміст ^{137}Cs у молоці 206 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів та створення довгострокового високоврожайного пасовища.

пасовище Озерська система (Озерське)

Частина випасу розташована на колишніх сільськогосподарських угіддях вздовж ріки Льва, на південь від села і починається за південною околицею. Відразу за селом худоба прогоном проходить до 1 кілометра між городами населення та окремими лісовими масивами. Потім через річку виходить на основний випас – окультурені пасовища на лівому березі ріки. Загальна площа випасу - в межах 60 га.

Угіддя характеризується як сухі та помірно свіжі злакові і злаково-різнотравні луки на дернових, лучних супіщаних і суглинкових ґрунтах. Пасовища з врожайністю до 25 ц/га сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності – велетенськомітлицеві та повзучопирійні. Режим зволоження помірний, задовільний. Травостій густий, при достатньому зволоженні продуктивний. Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані, трапляються невеликі ділянки торфових та торфово-болотних ґрунтів, в пониженнях заплави невеликі ділянки низинних лук.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 45 кБк/м², забруднення рослинності від 250 Бк/кг. Середнє забруднення молока ^{137}Cs коливається в різні роки від 80 до 202 Бк/л.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів та створення довгострокового високоврожайного пасовища.

урочища Годомля, Лесця

Випаси розташовані в сосново-березово-грабовому лісовому масиві. Ліс починається за околицею села і тягнеться в північно-східному напрямку до 3-7 кілометрів, де починаються випаси сусіднього населеного пункту. В ширину масив протягується на 3-5 кілометрів. Корови йдуть прогоном затримуючись на галявинах, заболочених луках вирубках та просіках. Межі між випасами немає, і один плавно переходить в інший. Загальна площа випасу біля 100 га.

Серед лісу трапляються наступні типи угідь: нормально та тимчасово підвищено-зволожені злаково-різнотравні луки на дернових, дерново-підзолистих глеювато-піщаних ґрунтах (врожайність до 7 ц/га сіна середньої якості); тимчасово

надмірно зволожені луки на дерново-підзолистих та дернових супіщаних ґрунтах (до 10 ц/га сіна задовільної якості), заболочені ділянки низинних лук на мулуватоболотних та торф'яноболотних ґрунтах (до 12 ц/га сіна низької якості). Серед фітоценотичного типу переважають різні види тонкомітлицевих угруповань. Видовий склад рослинності на болотах представлений осоками. Перераховані вище угіддя трапляються серед лісового масиву у вигляді мозаїчних утворень, невеликих відкритих ділянок та узлісь.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 45 кБк/м², забруднення рослинності 2600 Бк/кг і вище. Середній вміст ^{137}Cs у молоці - 152 - 202 Бк/л в різні роки спостережень. Усі проаналізовані проби перевищують ДР 2006.

Докорінне поліпшення угіддя не можливе.

урочища Токовище, Розсоха, Люте, Підніжінка

Угіддя, що використовується під випас - типовий для полісся лісовий масив з вкрапленнями низинних лук та заболочених ділянок. Ліс починається відразу за західною околицею села і тягнеться в західному напрямку до 5 кілометрів. В ширину масив протягується до 8 кілометрів. Серед лісу розгалужена мережа меліоративних каналів, поблизу яких корови переважно і випасаються. Випас корів відбувається шляхом прогону в частину масиву з більш продуктивними на момент випасання ділянками та галявинами, тому череди перебувають по чергові в різних частинах лісу. Меж між урочищами немає, різні назви мають окремі частини всього масиву, деякі галявини. Загальна площа випасу складає приблизно 200 га.

Серед угідь - нормально та тимчасово підвищено-зволожені злаково-різнотравні луки на дернових, дерново-підзолистих глеюватопіщаних ґрунтах (врожайність до 7 ц/га сіна середньої якості); тимчасово надмірно зволожені луки на дерново-підзолистих, дернових супіщаних ґрунтах (до 10 ц/га сіна задовільної якості), ділянки низинних лук на мулуватоболотних та торф'яноболотних ґрунтах (до 12 ц/га сіна низької якості); сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на торф'яноболотних ґрунтах (до 15 ц/га низькоякісного сіна). Режим зволоження надмірно вологий. Травостій середньо та високопродуктивний на відкритих частинах боліт, і майже відсутній в сосновому лісі.

Щільність забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 65 кБк/м², забруднення рослинності 4400 Бк/кг. Середній вміст ^{137}Cs у молоці 563 Бк/л. Всі проаналізовані проби значно перевищують ДР 2006.

Докорінне поліпшення угіддя не можливе

с. Великі Озера

Випаси: пасовища Шахівське, Став, Семиражі, урочище Ліс

Переважає більшість випасів населеного пункту - культурні пасовища розташовані на перелогах та полях меліоративних систем. Лише одна череда (до 25 голів) використовує для випасання худоби ліс. Культурними випасами худоба населення забезпечена не на сто відсотків. Причиною цього є велика кількість ВРХ і відсутність достатніх площ для розширення пасовищ.

урочище Семиражі

Пасовище розташоване на північному-сході від села, обмежене з правого боку рікою Льва, з лівого - лісовим масивом. Угіддя складається з кількох сільськогосподарських полів місцевого колгоспу, на даний час виведених з обігу, та частково охоплює заплаву ріки. Має чіткі межі і площу біля 45 га. Перезалужене в 2002 році. Худоба випасається по чергові на окремих ділянках випасу розділених каналами. Перехід на нові ділянки відбувається поступово. В посушливі періоди вибивається тваринами до ґрунту.

Угіддя характеризується як сухі та помірно свіжі злакові і злаково-різнотравні луки на дернових, лучних супіщаних і суглинкових ґрунтах. Пасовища з врожайністю від 10 до 15 ц/га сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності – велетенськомітлицеві та повзучопирійні.

Щільність забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 30 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 250 Бк/кг, молока - 42 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Докорінне поліпшення угіддя можливе шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів. Потенційно можливе створення довгострокового пасовища з високою врожайністю і якісним сіном.

урочище Шахівське

Пасовище на колишніх сільськогосподарських угіддях розташоване за два кілометри на північ від населеного пункту. До нього худоба проходить лісовим масивом. Складається з кількох ділянок перелогів розділених каналами на полях меліоративної системи, що періодично змінюють своє призначення. Пасовище інколи перезалужується і підсівається травами. Загальна площа випасу коливається в межах 30-35 га (це пов'язано з переведенням полів з одного статусу в інший). Худоба випасається на конкретних полях системи.

Угіддя характеризується як сухі та помірно сухі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених дерново-підзолистих піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах. Пасовища з врожайністю до 8-12 ц/га сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності, переважно пирійно-тонкомітлицеві. Висота пасовищної рослинності на момент обстеження становила 15 сантиметрів. В засушливі періоди травостій вибивається тваринами до ґрунту.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 50 кБк/м², забруднення рослинності 600 Бк/кг. Середнє забруднення молока 69 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів та створення довгострокового високоврожайного пасовища.

урочище Ліс

Природні угіддя, які використовується під випас, являють собою сосново-гарбовий ліс з низкою галявин та замкнутих понижень. Випас починається відразу за західною околицею села. В західному напрямку худоба вільно переміщається на кілька кілометрів. Загальна площа випасу чітко не визначена. Корови випасаються прогоном переходячи з галявини на галявину.

Пониження та галявини лісу характеризуються як тимчасово надмірно зволожені луки на дерново-підзолистих і дерново-супіщаних ґрунтах, місцями сирі та мокрі осоково-злакові луки на лучно-болотних та мулуватоболотних ґрунтах. Врожайність названих угідь становить 10 -15 ц/га сіна. Видовий склад типовий для вказаних типів угідь. Травостій середньої висоти та густоти.

Щільність забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 70 кБк/м², забруднення рослинності поблизу села 1250 Бк/кг. Забруднення молока 496 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Докорінне покращення випасу неможливе.

пасовище Став

Пасовище розташоване на південний-захід від населеного пункту і складається з двох частин перелогів загальною площею 72 га (30 та 42 га) розділених каналами. Пасовище було перезалужене в 2002 році та засіяне кормовими травами.

Угіддя характеризується як вологі злаково-різнотравні луки на осушених торфовищах. Фітоценотичний тип рослинності - різні види сіяних еумезофітних травостоїв. Врожайність не поліпшених лук 12-17 ц/га, сіянки до 30 ц/га. Ґрунти – потужні торф'яники. Режим зволоження задовільний. Рослинність середньо продуктивна, одноманітна.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 35 кБк/м², забруднення рослинності 150 Бк/кг. Середнє забруднення молока ^{137}Cs 19 Бк/л відповідно. Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів і створення довгострокового високоврожайного пасовища.

с. Великий Чермень

Випаси: урочища Жукова, Ліс, Бичиха, Ніжбер

Населений пункт має один культурний випас розташований в заплаві ріки Льва та ще кілька природних угідь, що використовуються під випаси. Загалом культурними випасами худоба населення забезпечена на половину, інші череди випасаються на територіях, які не забезпечують одержання «чистого» молока - в лісових масивах та на болотах.

пасовище Ніжбер

Окультурене пасовище розташоване в заплаві ріки Льва, що протікає через населений пункт. Ширина долини не перевищує 150 метрів. Площа випасу становить 25 га. Долина річки складена переважно піщаними дерново-підзолистими та дерново-глейовими ґрунтами. До 80 % території випасу на протязі останніх 10 років кілька разів було переоране. Частково, на території пасовища внесені добрива, проведений комплекс культуртехнічних та агротехнічних заходів для створення довгострокового високоврожайного пасовища.

Угіддя характеризується як свіжі злаково-різнотравні, переважно дрібно травні луки на дернових та дерново-слабопідзолистих глеюватих, піщаних та легко супіщаних ґрунтах. Серед масиву випасу трапляються ділянки та лінзи низинних лук на торфово-болотних ґрунтах. Пасовище середньої якості з врожайністю до 7 - 14 ц/га сіна посередньої якості. Фітоценотичний тип рослинності – тонкомітлицеві та різнотравно-червонокострицеві. Травостій густий, продуктивний при достатньому зволоженні. Навесні частина долини затоплюється талими водами. Худоба випасається на обох берегах річки.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 70 кБк/м², забруднення рослинності 1260 Бк/кг. Середнє забруднення молока від 126 до 299 Бк/л в різні роки спостережень. Перевищення ДР 2006 відмічено в усіх пробах.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів та створення довгострокового високоврожайного пасовища.

урочища Жукова, Ліс

Природні угіддя у вигляді заболочених низинних лук з вкрапленнями блюдець боліт, що використовуються під випас, розташовані на схід від села. Угіддя протягуються в напрямку населеного пункту Вежиця до 3 кілометрів в довжину і до 2 кілометрів завширшки. Використовується як випас для ВРХ населених пунктів Вежиця та Великий Чермень, а інколи як сінокоси. Чітко виражених меж випасу немає.

Випас класифікується як вологі та сирі злаково-різнотравні та злаково-осоково-різнотравні луки на осушених торф'яно-болотних ґрунтах та торфовищах. Урожайність 12-15 ц/га не досить якісного сіна. Режим зволоження надмірно вологий.

Більшу частину періоду випасання окремі місця угіддя вкриті водою. Травостій густий середньо продуктивний.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 135 кБк/м^2 , забруднення рослинності 2500 Бк/кг . Середній вміст радіоцезію у молоці від 420 до 529 Бк/л в різні роки спостережень. Перевищення ДР 2006 відмічено в усіх пробах.

Можливе докорінне поліпшення окремих ділянок угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів та створення довгострокового високоврожайного пасовища.

урочище Бичиха

Природні угіддя у вигляді низинних лук розташовані на південь від села. Корови які пасуться на цьому випасі заходять по декілька кілометрів на південь та на захід. Територія випасу становить до 140 га.

Випас класифікується як болотні різнотравно-злаково-осокові та мохово-осокові угіддя на евтотрофних торфовищах. Ґрунти – торфово-болотні та мулуваті- болотні. Урожайність 5-12 ц/га сіна низької якості. Режим зволоження надмірно вологий. Більшу частину періоду випасу окремі місця угіддя вкриті водою. Травостій густий середньо продуктивний. Серед фітоценотичного типу переважають різні види гіпново-осокових угруповань

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 45 кБк/м^2 , забруднення рослинності 2500 Бк/кг . Середній вміст радіоцезію у молоці 257 Бк/л. Перевищення ДР 2006 відмічено в усіх пробах.

Докорінне поліпшення угіддя не можливе

с. Жадень

Випаси: урочища Островки, Велике Болото, Вязники

Природні угіддя, що використовуються під випаси знаходяться на заплаві ріки Случ та в навколишніх лісових масивах. Культурними пасовищами або покращеними природними випасами худоба населення не забезпечена.

урочище Острівки

Угіддя, що використовуються під випас - типовий для Полісся мішаний лісовий масив з вкрапленнями низинних лук та заболочених ділянок. Ліс починається відразу за південною околицею села і тягнеться на південь та південний схід в напрямку с.Будимля. Серед лісу розташована розгалужена мережа меліоративних каналів, поблизу яких корови переважно і випасаються. Випас корів відбувається шляхом прогону, тому череди перебувають по чергові в різних частинах лісу. Загальна площа випасу перевищує 100 га.

На даній території зустрічаються такі типи угідь: нормально та тимчасово підвищено-зволожені злаково-різнотравні луки на дернових, дерново-підзолистих глеюватих-піщаних ґрунтах (урожайність до 7 ц/га сіна середньої якості); тимчасово надмірно зволожені луки на дерново-підзолистих, дернових супіщаних ґрунтах (до 10 ц/га сіна задовільної якості), ділянки низинних лук на мулуватих-болотних та торф'яно-болотних ґрунтах (до 12 ц/га сіна низької якості); сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на торф'яно-болотних ґрунтах (до 15 ц/га низькоякісного сіна). Режим зволоження надмірно вологий.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 40 кБк/м^2 , забруднення рослинності 1400 Бк/кг . Середній вміст радіоцезію у молоці 181 Бк/л. Усі проаналізовані проби перевищують ДР 2006.

Докорінне поліпшення угіддя не можливе.

урочище Велике Болото

Випас знаходиться на північ від села частково на перелогах меліоративної системи та на суміжній до неї території природних боліт. Загалом площа випасу перевищує 30 га. На даній території відбуваються процеси відновлення природних ценозів, що існували до цього. Ґрунти дерново-підзолисті піщані, на низинних рівнинах – лукові, мулуватоболотні та торфові.

Серед рослинності переважають злакові. Продуктивність випасів на дерново-підзолистих ґрунтах не перевищує 10 ц/га. Випасаючись худоба заходить в навколишні соснові бори. Окремі ділянки випасу розорані місцевим населенням під городи.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs не перевищує 25 кБк/м², рослинності - 300 Бк/кг. Середнє забруднення молока 25 Бк/л.

Можливе докорінне поліпшення більшої частини угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Вязники

Природні угіддя розташовані на захід від населеного пункту на низинній частині заплави ріки Горинь. Площа випасу близько 20 га. Навесні урочище на короткий період затоплюється талими водами. Внаслідок значної строкатості ґрунтових умов на заплавах луках наявні ділянки з мінеральними дерново-глейовими, супіщаними або суглинистими ґрунтами та органогенними, торф'яно-болотними (низинного типу із ступенем розкладу торфу 40-50%).

Угіддя характеризується як свіжі злаково-різнотравні луки на дернових та дерново-слабопідзолистих, глеюватих, піщаних та легко супіщаних ґрунтах. Пасовища середньої якості з урожайністю до 10 - 20 ц/га сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності – тонкомітлицеві та різнотравно-червонокострицеві, на понижених ділянках рельєфу трапляються угруповання осокових. Травостій густий, продуктивний.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 20 кБк/м², забруднення рослинності 200 Бк/кг. Середній вміст радіоцезію у молоці 38 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Можливе докорінне поліпшення окремих ділянок угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів.

с. Лугове

Випаси: Став - 2, урочища Вали та Забільськ

Населений пункт має кілька культурних випасів розташованих в різних частинах заплави ріки Случ. Загалом культурними випасами худоба населення забезпечена майже повністю.

пасовище Став - 2

Пасовище розташоване на схід від населеного пункту. Площа випасу близько 45 га. З півночі обмежене меліоративним каналом, інший канал розділяє пасовище на дві частини. Ширина каналу не дозволяє тваринам переходити з одного пасовища на інше. Угіддя простягається на відстань до 1.5 кілометра вздовж основного каналу, розташоване на низинній заплаві ділянці. В 2002 році було пере залужене і засіяне кормовими травами.

Угіддя характеризується як вологі злаково-різнотравні луки на осушених торфовищах. Фітоценотичний тип рослинності - різні види сіяних еумезофітних травостоїв, які є потенційно найбільш родючими і придатними для створення довгострокових сіяних лукопасовищних угідь. Урожайність не поліпшених лук 12-17 ц/га. Ґрунти – потужні торф'яники. Режим зволоження задовільний. Рослинність середньо продуктивна, одноманітна, в посушливі періоди низькоросла, вибивається худобою до дернини.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 25 кБк/м^2 , забруднення рослинності 1250 Бк/кг . Середній вміст радіоцезію у молоці 187 Бк/л відповідно. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів і створення довгострокового високоврожайного пасовища.

урочище Вали

Природні угіддя розташовані на північ від населеного пункту на заплаві ріки Горинь. Площа випасу близько 15 га . Навесні та при паводках угіддя затоплюється річковими водами.

Угіддя характеризується як вологі злакові і злаково-різнотравні луки на дернових, лучних супіщаних і суглинкових ґрунтах. Серед загального масиву випасу місцями (до 20% площі) зустрічаються ділянки низинних лук на торф'яних ґрунтах. Пасовища доброї, рідше середньої якості з урожайністю до $10 - 25 \text{ ц/га}$ сіна. Фітоценотичний тип рослинності – велетенськомітлицеві, лучнокострицеві та повзучопирійні. Травостій густий, продуктивний при достатньому зволоженні.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 20 кБк/м^2 , забруднення рослинності 500 Бк/кг . Середній вміст радіоцезію у молоці 89 Бк/л . Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Можливе докорінне поліпшення окремих ділянок угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Забільськ

Урочище розташоване на захід від села на перелогах на місці колишніх сільськогосподарських полів та на неугіддях. Має чіткі межі і площу 20 га . Випасаючись на полях худоба заходить в навколишні соснові лісові посадки, інколи виходить на заплаву. Окремі ділянки випасу розорані місцевим населенням під городи.

Угіддя характеризується як свіжі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених піщаних ґрунтах і слабо задернованих пісках. Урожайність $14-16 \text{ ц/га}$ сіна низької якості. Фітоценотичний тип рослинності – наземнокуничникові. Травостій низькопродуктивний.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs не перевищує 25 кБк/м^2 , рослинності – 350 Бк/кг . Середнє забруднення молока 46 Бк/л .

Можливе докорінне поліпшення на частині угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

с. Миляч

Випаси: Став - 1 та Став - 2, За дамбою, урочища Бродок, Колодоваха.

Населений пункт має кілька культурних випасів розташованих в різних частинах заплави ріки Случ, та ще декілька природних угідь, що використовуються під випаси. Загалом культурними випасами худоба населення забезпечена майже повністю, хоча деякі череди випасаються в лісових масивах.

пасовище Став - 1 та Став - 2

Пасовища розташовані на південь від населеного пункту. Меліоративний канал розділяє їх на дві приблизно рівні частини площами 43 та 45 га . Ширина каналу не дозволяє тваринам переходити з одного пасовища на інше. Угіддя протягується на відстань до 1.5 кілометра вздовж каналу. Пасовище розташоване на низинній заплавному ділянці було перезалуженим в 2002 році так засіяне кормовими травами.

Угіддя характеризується як вологі злаково-різнотравні луки на осушених торфовищах. Фітоценотичний тип рослинності – різні види сіяних еумезофітних травостоїв. Урожайність не поліпшених лук $12-17 \text{ ц/га}$. Ґрунти – потужні торф'яники.

Режим зволоження задовільний. Рослинність середньо продуктивна, одноманітна. В посушливі періоди низькоросла, вибивається худобою до дернини.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 25 кБк/м^2 , забруднення рослинності 1250 Бк/кг . Середній вміст радіоцезію у молоці 171 та 187 Бк/л відповідно. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів і створення довгострокового високоврожайного пасовища.

урочище Борок

Угіддя розташоване на північ від населеного пункту. Воно включає в себе частину заплави ріки Горинь та рідколісся площею до 35 га . Худоба випасається і на відкритих ділянках заплави і в лісі на галявинах, вирубках та в перезволожених пониженнях лісу. За селом ліс місцями вирубаний на $30-40\%$. Порослі чагарником ділянки інтенсивно використовуються під випаси.

Угіддя характеризується як сухі та помірно сухі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених дернових і дерново-підзолистих, оглеєних піщаних та глинисто-піщаних ґрунтах. Місцями трапляються слабо задерновані піски з низькопродуктивною рослинністю. Урожайність $5-10 \text{ ц/га}$ сіна середньої якості. Рослинність в лісі низько продуктивна. Зустрічаються не великі за площею ділянки з вологими різнотравно-злаковими та злаково-осоковими луками з врожайністю $7-12 \text{ ц/га}$ сіна низької якості.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs - 30 кБк/м^2 . Середнє забруднення рослинності ^{137}Cs - 425 Бк/кг , молока - 44 Бк/л . Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Докорінне поліпшення деяких частин угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів можливе тільки на невеликих за територією ділянках.

урочище За Дамбою

Пасовище розташоване на південь від населеного пункту на заплаві ріки Горинь. Природне угіддя має обмежені меліоративними каналами та захисною дамбою межі. Площа випасу близько 20 га . Пасовище є частиною низинної заплавної ділянки яка навесні затоплюється талими водами.

Угіддя характеризується як свіжі злаково-різнотравні, переважно дрібно травні луки на дернових та дерново-слабопідзолистих глеюватих, піщаних та легко супіщаних ґрунтах. Серед загального масиву випасу трапляються ділянки типових низинних лук на торф'яних ґрунтах. Пасовища середньої якості з урожайністю до $10 - 20 \text{ ц/га}$ сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності – тонкомітлицеві та різнотравно-червонокострицеві. Травостій густий, продуктивний при достатньому зволоженні.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 25 кБк/м^2 , забруднення рослинності 250 Бк/кг . Середнє забруднення молока - 38 Бк/л . Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Можливе докорінне поліпшення окремих ділянок угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Колодоваха

Випас розташований на схід від населеного пункту в сосновому лісовому масиві. Ліс починається за околицею села і тягнеться в східному напрямку на десятки кілометрів де починаються випаси сусіднього населеного пункту Будимля. Серед лісу розгалужена мережа меліоративних каналів навколо яких худоба переважно і випасається. Випас корів відбувається шляхом прогону в частину масиву з більш продуктивними, на даний момент, ділянками та галявинами, тому череди перебувають по чергову в різних частинах лісу.

Серед лісу трапляються наступні типи угідь: нормально та тимчасово підвищено-зволожені злаково-різнотравні луки на дернових і дерново-підзолистих глеювато-піщаних ґрунтах (урожайність до 7 ц/га сіна середньої якості); тимчасово надмірно зволожені луки на дерново-підзолистих в дернових супіщаних ґрунтах (до 10 ц/га сіна задовільної якості); заболочені ділянки низинних лук на мулувато-болотних та торф'яно-болотних ґрунтах (до 12 ц/га сіна низької якості). Серед фітоценотичного типу переважають різні види тонкомітлицевих угруповань. Видовий склад рослинності на болотах представлений осоками. Режим зволоження надмірно вологий. Травостій середньо та високопродуктивний на відкритих частинах болота і майже відсутній в сосновому лісі.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 30 кБк/м², забруднення рослинності 800 Бк/кг і вище. Середнє забруднення молока -104 Бк/л. До 50 % проаналізованих проб перевищують ДР 2006 на 30-50 відсотків.

Докорінне поліпшення угіддя не можливе.

с. Переброди

Випаси: Льва (Андряки), Вербилков, Чапелька (Погиблі), Грачиці (Железо)

Основні випаси населеного пункту – природні угіддя мало пристосовані під випасання худоби. Більша частина стада випасається серед лісових масивів та на болотах, що використовуються під випаси. Неширока та малопродуктивна долина ріки Льва забезпечує до 25-30% необхідних площ для створення випасів. Великих відкритих ділянок для створення культурних випасів навколо населеного пункту немає. Всі наявні площі використовуються населенням під городи.

урочище Льва (Андряки)

Угіддя розташоване в заплаві ріки Льва на півночі від населеного пункту. Ріка протікає територією селищної ради з півдня на північ більше 6 кілометрів. Ширина долини не перевищує 200 метрів. Площа випасу становить до 20 га. Долина річки складена переважно піщаними дерново-підзолистими ґрунтами.

Угіддя характеризується як свіжі злакові і злаково-різнотравні, переважно дрібно травні луки на дернових супіщаних та суглинкових ґрунтах. Пасовища доброї, рідше середньої якості з урожайністю до 10 - 25 ц/га сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності – велетенськомітлицеві та повзучопирійні. Травостій густий, продуктивний при достатньому зволоженні. Навесні більша частина долини затоплюється талими водами. Худоба випасається на обох берегах річки.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 35 кБк/м², забруднення рослинності 160 Бк/кг. Середнє забруднення молока - 60 Бк/л. Перевищень ДР 2006 не відмічено.

Можливе докорінне поліпшення окремих ділянок угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів та створення довгострокового високоврожайного пасовища.

урочище Вербилков

Природні угіддя розташовані на північно-західній частині території селищної ради. Угіддя не має чітких контурів і великих відкритих ділянок. Загальна площа випасу коливається в межах 80 га. Типовий ландшафт поліського лісу. Худоба випасається прогоном, без прив'язки до певного місця на великій території.

Серед лісу у вигляді мозаїчних вкраплень трапляються наступні типи угідь: нормально та тимчасово підвищено-зволожені злаково-різнотравні луки на дернових і дерново-підзолистих, глеювато-піщаних ґрунтах (урожайність до 7 ц/га сіна середньої якості); тимчасово надмірно зволожені луки на дерново-підзолистих, дернових супіщаних ґрунтах (до 10 ц/га сіна задовільної якості), заболочені ділянки низинних

лук на мулуватоболотних та торф'яноболотних ґрунтах (до 12 ц/га сіна низької якості). Серед фітоценотичного типу переважають різні види тонкомілицевих угруповань. Видовий склад рослинності на болотах представлений осоками. Рослинність на заболочених місцях густа, в рідколіссі - малопродуктивна.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs становить 35 кБк/м², рослинності 620 Бк/кг. Середнє забруднення молока радіо цезієм не перевищує 87 Бк/л. Перевищення ДР-2006 на рівні 10% відмічене в 30% проб в 2007 році. В залежності від погоднокліматичних умов кількості забрудненого молока з перевищенням допустимих рівнів може коливатися як в одну, так і в іншу сторону.

Докорінне поліпшення угіддя не можливе.

урочища Чапелька (Погиблі)

Природні угіддя розташовані на східній частині території сільської ради відразу за околицею населеного пункту. Угіддя не мають чітких контурів і є частиною великої заболоченої території. Лісові масиви передуються з великими відкритими заболоченими територіями, частково болотами порослими чагарниками. Болото більшу частину пасовищного сезону вкрите водою, місцями непрохідне для худоби. Корови випасаються на великій території на відстані до 3-5 кілометрів від села.

Випас характеризується як болотні різнотравно-злаково-осокові та мохово-осокові угіддя на евтотрофних торфовищах. По межі боліт поширені на невеликій за площею території сирі та мокрі луки на торфовоболотних ґрунтах. Урожайність від 5 до 12 ц/га сіна низької якості. Серед фітоценотичного типу переважають різні види гіпново-осокових угруповань. Видовий склад рослинності на болотах представлений переважно осоками, мітлицею та куничником.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs становить 45 кБк/м², рослинності 1400 Бк/кг. Середнє забруднення молока від 207 до 409 Бк/л в різні роки спостережень. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах

Докорінне поліпшення угіддя не можливе.

урочища Грачищі (Железо)

Випас розташований в сосново-березово-грабовому лісовому масиві. Ліс починається за околицею села і тягнеться в південному та південно-західному напрямку до 3-5 кілометрів, де починаються випаси ур. Годомля сусіднього населеного пункту Будимля. Корови йдуть прогоном затримуючись на галявинах, заболочених луках та просіках. Межі поміж випасами немає. Загальна площа випасу коливається в межах 120 га.

Серед лісу трапляються наступні типи угідь: нормально та тимчасово підвищено-зволожені злаково-різнотравні луки на дернових і дерново-підзолистих глеюватопіщаних ґрунтах (урожайність до 7 ц/га сіна середньої якості); тимчасово надмірно зволожені луки на дерново-підзолистих та дернових супіщаних ґрунтах (до 10 ц/га сіна задовільної якості), заболочені ділянки низинних лук на мулуватоболотних та торф'яноболотних ґрунтах (до 12 ц/га сіна низької якості). Серед фітоценотичного типу переважають різні види тонкомілицевих угруповань. Видовий склад рослинності на болотах представлений осоками. Перечисленні вище угіддя трапляються серед лісового масиву в вигляді мозаїчних утворень, невеликих відкритих ділянок та узлісь.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 35 кБк/м², забруднення рослинності 1600 Бк/кг і вище. Середнє забруднення молока -127 Бк/л. До 90 % проаналізованих проб перевищують ДР 2006 на 40-50 відсотків.

Докорінне поліпшення угіддя не можливе.

с. Шахи

Випаси: урочища Заброддя та Східне.

Населений пункт має культурний випас розташований відразу за селом зі східної сторони на колишніх сільгоспугіддях, де випасається більша частина ВРХ села. Інша частина випасається на природних угіддях серед лісового масиву. Загалом площі культурного випасу достатньо для усіх корів села, необхідні тільки організаційні заходи для покращення ситуації.

урочище Східне

Випас розташовується у лісовому масиві. Ліс починається відразу за селом і тягнеться в західному напрямку на десятки кілометрів. Корови йдуть прогоном затримуючись на галявинах та заболочених луках. Загальна площа випасу не визначена.

Серед лісу трапляються такі типи угідь: нормально та тимчасово підвищено-зволожені злаково-різнотравні луки на дернових і дерново-підзолистих глеювато-піщаних ґрунтах (урожайність до 7 ц/га сіна середньої якості); тимчасово надмірно зволожені луки на дерново-підзолистих та дернових супіщаних ґрунтах (до 10 ц/га сіна задовільної якості), заболочені ділянки низинних лук на мулувато-болотних та торф'яно-болотних ґрунтах (до 12 ц/га сіна низької якості). Серед фітоценотичного типу переважають різні види тонкомітлицевих угруповань. Видовий склад рослинності на болотах представлений осоками.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 45 кБк/м², забруднення рослинності 1800 Бк/кг. Середнє забруднення молока -189 Бк/л. Всі проаналізовані проби значно перевищують ДР 2006.

Докорінне поліпшення угіддя не можливе.

пасовище Заброддя.

Пасовище на колишніх сільськогосподарських угіддях розташоване відразу за городами селян зі східної сторони населеного пункту. Складається з кількох ділянок перелогів розділених каналами. Загальна площа випасу коливається в межах 20 га.

Угіддя характеризується як сухі та помірно сухі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених дернових і дерново-підзолистих піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах. Пасовища з урожайністю до 12 ц/га сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності - пирійно-тонкомітлицеві. В різних частинах випасу травостій має відмінності: густий та продуктивний в пониженнях (трапляються локальні вклинення торф'яних ґрунтів), та вибитий і рідкий на підвищеннях - на слабо задернованих піщаних ґрунтах. Висота пасовищної рослинності на момент обстеження становила 10 сантиметрів. В засушливі періоди травостій вибивається тваринами до ґрунту.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 85 кБк/м², забруднення рослинності 450 Бк/кг. Середнє забруднення молока 53 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Можливе докорінне поліпшення окремих ділянок угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів та створення довгострокового високоврожайного пасовища.

Зарічненський район

с. Бір

Населений пункт не забезпечений пасовищами. Худоба випасається по заболоченому лісовому масиву. Території для створення пасовищ відсутні.

урочище Каливорт

Єдиний випас населеного пункту розташований серед лісового масиву. Природні угіддя у вигляді порослих лісом заболочених територій поширюються на південь і захід від села. Угіддя оточують населений пункт і займають велику територію навколо нього. Місцями трапляються ділянки соснового лісу з дерново-підзолистим піщаним ґрунтом, але переважна більшість (понад 50 %) припадає на заболочені

ділянки змішаного сосново-грабового лісу. Чітко виражених меж випасу немає. Загальна площа становить близько 100 га. Ґрунти переважно торфово-болотні з різним ступенем оглеєння.

Серед лісу трапляються наступні типи угідь: тимчасово надмірно зволожені луки на дерново-підзолистих і дернових супіщаних ґрунтах (до 10 ц/га сіна задовільної якості), заболочені ділянки низинних лук на мулуватоболотних та торф'яно-болотних ґрунтах (до 12 ц/га сіна низької якості). Серед фітоценотичного типу переважають різні види тонкомітлицевих угруповань. Видовий склад рослинності на болотах представлений осоками. Перераховані ділянки зустрічаються серед лісового масиву в вигляді мозаїчних утворень та на узліссях.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 90 кБк/м², забруднення рослинності - 3200 Бк/кг, забруднення молока від 285 до 412 Бк/л в різні роки спостережень. Перевищення ДР-2006 спостерігалось усіх пробах.

Докорінне поліпшення не можливе.

с. Борове

Випаси: урочища Дитячі та Мулярове, Велике і Рибакове.

Усі випаси можна розділити на дві групи природні і культурні. Причому площа культурних повністю задовольняє усі потреби села. Природні випаси в лісах в напрямку хутора Лисичин розташовані на потужних болотах та на заболочених галявинах. Забруднене вище норми молоко постійно надходить з цих випасів.

урочище Дитячі

Природні угіддя розташовані на захід від населеного пункту. Включає в себе сосновий лісовий масив площею до 100 га на борових пісках, в якому трапляються галявини (2-3 га). Галявини місцями заболочені, місцями низькопродуктивні випаси на дерново-підзолистих ґрунтах. Далі від села зустрічаються острівки справжнього болота, основний масив якого починається відразу за лісом. Худоба йде прогоном кілька кілометрів до відкритої частини випасу.

Відкрита частина випасу класифікується як сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на лучно-болотних, мулуватоболотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Фітоценотичний тип рослинності – різнотравно-повзучомітлицеві, собачомітлицеві та осокові. Урожайність 15-25 ц/га сіна низької якості. Режим зволоження випасу на болоті надмірний.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 25 кБк/м², забруднення рослинності - 1450 Бк/кг, вміст ^{137}Cs в молоці коливається від 201 до 342 Бк/л в різні роки спостережень. Двох-чотирьох разове перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Докорінне поліпшення не можливе.

урочище Мулярове

Природні угіддя розташовані на північно-західній частині території сільської ради на відстані 2-3 кілометрів від населеного пункту. Угіддя не має чітких контурів і є частиною великої заболоченої території. Територія частково вкрита сосново-грабовим лісом. Болото в деяких місцях вкрите водою, худоба випасається на площі близько 60 га на більш сухих місцях, заходячи далі в посушливі періоди або в другій половині вигульного сезону.

Відкрита частина випасу класифікується як сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на лучно-болотних, мулуватоболотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Фітоценотичний тип рослинності – різнотравно-повзучомітлицеві, собачомітлицеві та різнотравно-осокові. Урожайність 15-25 ц/га сіна низької якості.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 22 кБк/м², забруднення рослинності - 1300 Бк/кг, вміст ^{137}Cs в молоці коливається від 211 до 428 Бк/л в різні роки спостережень. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Докорінне поліпшення не можливе.

пасовище Велике

Культурне пасовище починається відразу за північною околицею села і розміщується на меліоративній системі сільськогосподарського призначення. Угіддя має чіткі контури і площу близько 200 га. Воно розташоване на перелогах, які виведені з обороту і займає всю ліву сторону системи. Канали відокремлюють поля, створюючи систему випасання, що обмежує випас і сприяє раціональному використанню пасовища. Останнє перезалуження та підсів пасовища відбувалося до 2000 року. Ґрунти на всіх полях системи дерново-підзолисті піщані.

Угіддя характеризується як сухі та помірно сухі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених дернових, дерново-підзолистих піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах. Врожайність до 10 ц/га сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності - пирійно-тонкомітлицеві. Режим зволоження помірний, задовільний. Травостій густий, продуктивний при достатньому зволоженні. Висота пасовищної рослинності не перевищує 15 сантиметрів. В засушливі періоди травостій вибивається тваринами до дернини.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 45 кБк/м², забруднення рослинності - 110 Бк/кг, забруднення молока не перевищує 52 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене за всі роки спостережень.

Потребує поверхневого поліпшення та підсіву трав.

пасовище Рибакове

Культурне пасовище починається відразу за північно-східною околицею і розміщується на правій стороні меліоративної системи. Частина системи розділені великим каналом, що не дає тваринам переходити з одної на другу. Угіддя має чіткі контури і площу близько 120 га. Характеристики аналогічні пасовищу Система.

Угіддя характеризується як сухі та помірно сухі злаково-різнотравні луки на дерново-підзолистих піщаних ґрунтах. Урожайність - до 10 ц/га сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності - пирійно-тонкомітлицеві. Режим зволоження помірний, задовільний. Травостій продуктивний при достатньому зволоженні, в засушливі періоди вибивається тваринами до дернини.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 20 кБк/м², забруднення рослинності - 90 Бк/кг, забруднення молока не перевищує 48 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене за всі роки спостережень.

Потребує поверхневого поліпшення та підсіву трав.

с. Зелена Діброва

Випаси: урочища Зелене та Стир

Населений пункт в цілому забезпечений природними випасами для ВРХ. Худоба випасається на заплаві ріки Стир та по заболоченому лісовому масиву.

урочище Зелене

Природні угіддя у вигляді заболоченого лісового масиву тягнуться на схід та південний-схід від села. Угіддя не мають окреслених контурів. Лісові галявини та вирубки, порослі чагарниками, різні за площами вкраплення ділянки боліт - є основними випасами для худоби. Заболочених ділянок до 35% території масиву. Худоба випасається прогоном туди і назад. Загальна площа випасу становить близько 100 га. Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані під сосновими посадками та торфово-болотні на заболочених ділянках випасу

На випасі зустрічаються такі типи угідь: тимчасово надмірно зволожені луки на дерново-підзолистих в дернових супіщаних ґрунтах (до 10 ц/га сіна задовільної якості), заболочені ділянки низинних лук на мулуватоболотних та торф'яно-болотних ґрунтах (до 12 ц/га сіна низької якості). Серед фітоценотичного типу переважають різні види тонкомітлицевих угруповань. Видовий склад рослинності на болотах представлений різновидами осок.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 25 кБк/м², забруднення рослинності - 780 Бк/кг. Середнє забруднення молока не перевищує 93 Бк/л, коливаючись від 70 до 120 Бк/л. Незначне до 20% перевищення ДР-2006 відмічене у 25% проб.

Докорінне поліпшення не можливе.

урочище Стир

Природні угіддя розташовані на заплаві ріки Стир на північ від населеного пункту. Ріка протікає територією сільської ради з південного-заходу на північний-схід більше 4 кілометрів. Ширина долини коливається в широких межах, від 500 м до 1,5 км. Долина річки складена переважно піщаними дерново-підзолистими ґрунтами. Навесні більша частина долини затоплюється талими водами. Худоба випасається на правому березі. До пасовища вона проходить кілька кілометрів вздовж меліоративного каналу. В дощові роки кормів вистачає і вздовж каналу, тому худоба випасається неподалік від села.

Угіддя характеризується як сируваті та сирі різнотравно-злакові й осокові луки на дернових і лучних глейових, супіщаних та суглинкових ґрунтах. Фітоценотичний тип – лисячоосокові та інші. Серед рослин переважають бекманія звичайна, очеретянка звичайна, мітлиця повзуча та інші. Сіножаті та пасовища доброї та середньої якості. Урожайність до 25 ц/га сіна.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 30 кБк/м², забруднення рослинності - 460 Бк/кг, забруднення молока 52 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічено.

Можливе поверхнєве поліпшення угіддя та щорічне підживлення добривами.

с. Лисичин

Випаси: урочища Муляр, Риболов, Рядно

Населений пункт розташований серед лісового масиву та долинних боліт. Північна, західна та південно-західна частина території населеного пункту примикає до великої заболоченої площі, що тягнеться на південного-заходу на північний-схід більш ніж на десять кілометрів. Ця територія є заплавою не великої річки Річиця і використовується населенням як сінокоси та випаси для ВРХ. В дощові роки велика частина вказаної ділянки вкривається водою, в засушливі - стає більш доступною для худоби.

урочище Мулярове

Природні угіддя розташовані на півночі від села відразу за останніми хатами. Угіддя має чіткі контури і є частиною великого долинного болота. Загальна площа випасу становить близько 100 га. Худоба проходить угіддям до кілометра від населеного пункту. Болото в деяких місцях вкрите водою.

Угіддя класифікується як сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на лучно-болотних, мулуватоболотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Фітоценотичний тип рослинності – різнотравно-повзучомітлицеві, різнотравно-собакомітлицеві та різнотравно-осокові. Урожайність 15-25 ц/га сіна низької якості.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 17 кБк/м², забруднення рослинності - 1700 Бк/кг, вміст радіоцезію у молоці коливається від 193 до 606 Бк/л в різні роки спостережень. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Докорінне поліпшення не можливе.

урочище Риболов

Природні угіддя розташовані на північно-західному напрямку від села і є середньою частиною заболоченої заплави. Площа випасу становить близько 120 га. Худоба проходить угіддям до двох кілометра від населеного пункту. Болото в деяких місцях вкрите водою. Ґрунти переважно торфово-болотні, місцями зустрічаються потужні торф'яники.

Угіддя класифікуються як сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на лучно-болотних, мулуватоболотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Фітоценотичний тип рослинності – різнотравно-повзучомітлицеві, різнотравно-собакомітлицеві та різнотравно-осокові. Урожайність 15-25 ц/га сіна низької якості.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 20 кБк/м², забруднення рослинності - 1800 Бк/кг, забруднення молока коливається від 242 до 380 Бк/л в різні роки спостережень. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Докорінне поліпшення не можливе.

урочище Рядно

Природні угіддя, що використовуються під випас, у вигляді заболочених низинних лук з вкрапленнями блюдець боліт. Розташоване у південно-західній частині долини. Загальна площа випасу становить більше 160 га. Худоба проходить випасом до 4-5 кілометрів на південний захід.

Угіддя класифікується як вологі та сирі злаково-різнотравні та злаково-осоково-різнотравні луки на осушених торф'яно-болотних ґрунтах та торфовищах. Урожайність 12-17 ц/га (місцями і вище) не досить якісного сіна. Режим зволоження надмірно вологий. Більшу частину періоду випасу окремі місця угіддя вкриті водою (до 3 місяців). Травостій густий середньо та високопродуктивний.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 15 кБк/м², середнє забруднення рослинності 2200 Бк/кг. Середнє забруднення молока 281 - 419 Бк/л (в різні періоди випасання худоби). Значне перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Можливе докорінне поліпшення окремих незначних за площею ділянок угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

с. Млинок

Випаси: урочища Юрківське, Потереби, Ріг, Боровська система.

Населений пункт розташований на заплаві р. Стир. Випасами місцева худоба забезпечена повністю. Північна та західна частини території, що примикають до населеного пункту є чітко вираженими заплавами луками на алювіальних відкладах, складених піщаними ґрунтами з невеликими вкрапленнями торфово-болотних ґрунтів в пониженнях рельєфу. На південь від села паралельно річці простягнулася заболочена низька заплава складена переважно торфово-болотними ґрунтами. Ця територія використовується населенням як сінокоси та випаси для худоби. В дощові роки велика частина вказаної ділянки на тривалий час вкривається водою, в засушливі - стає більш доступною для худоби.

пасовище Ріг

Культурне пасовище розташоване на північ та північний-захід від села. Воно включає в себе колишні сільськогосподарські угіддя та невіддя навколо вузькоколійної дороги, що перетинає територію населеного пункту з заходу на схід. Останній раз було переоране та підсіяне травами до 2000 року. Пасовище має чіткі

контури і площу близько 120 га. Розташоване на перелогах і характеризується як сухі та помірно сухі злаково-різнотравні луки на дерново-підзолистих піщаних ґрунтах. Урожайність до 10 ц/га сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності - пирійно-тонкомітлицеві. Режим зволоження помірний, задовільний. Травостій продуктивний при достатньому зволоженні, в посушливі періоди вибивається тваринами до дернини.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 25 кБк/м², забруднення рослинності - 320 Бк/кг, забруднення молока не перевищує 38 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене за всі роки спостережень.

Потребує поверхневого поліпшення та підсіву трав.

урочище Юрківське

Природне угіддя та сінокіс починаються на південь від села. Воно розташоване на заболоченій заплаві ріки Стир. Місцями територія розорана під городи та зайнята присадибними ділянками населення. Тут же містяться хутори та огорожені сінокоси. Загальна площа угіддя перевищує 200 га.

Випас характеризується переважно як сирі та мокрі різнотравно-злаково-осокові луки на лучно-болотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Фітоценотичний тип рослинності: різнотравно-повзучомітлицеві та різнотравно-чорноосокові. Урожайність до 20 ц/га не досить якісного сіна. Худоба проходить випасом на південь до 3 кілометрів заходячи далі в глибину угіддя по мірі зниження рівня води на заплаві. Угіддя широко використовується під сінокоси. Ґрунти лучно-болотні та торфово-болотні, трапляються дернові оглеєні. Режим зволоження надмірно вологий.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 15 кБк/м², забруднення рослинності - 1600 Бк/кг, забруднення молока - 170 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Потереби

Природні угіддя починаються відразу за північно-східною околицею села і протягуються вздовж ріки Стир на заплаві. Місцями територія угіддя розорана та відгороджена під сінокоси. Худоба випасається на значній території завтовшки до 5-7 кілометрів на північ. Загальна площа угіддя перевищує 150 га.

Характеризується переважно як свіжі та вологі злакові і злаково-різнотравні луки на дернових лучних супіщаних та суглинкових, місцями трапляються мокрі злаково-різнотравні луки. Фітоценотичний тип рослинності переважно велетенськомітлицеві та лучнокострицеві. Сіножаті та пасовища доброї та середньої якості. Урожайність 10-25 ц/га. Значна частина випасу вибивається худобою до ґрунту до середини пасовищного періоду. Навесні долина на короткий час затоплюється талими водами.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs становить 23 кБк/м², рослинності 480 Бк/кг. Середнє забруднення молока ^{137}Cs 50 Бк/л (коливається від 20 до 87 Бк/л). Незначне перевищення ДР-2006 відмічене в кількох відібраних пробах.

Потребує щорічного поверхневого підживлення. Можливе докорінне поліпшення більшої частини угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

пасовище Боровська система

Культурне пасовище розташоване на південному заході від села на колишніх полях колективного господарства. Загальна площа угіддя не перевищує 40 га. Худоба випасається по черзі на кількох полях системи та частково на навколишніх угіддях. За

тривалий період після перезалуження відбувається відновлення природних ценозів. Ґрунти виключно дерново-підзолисті піщані. Режим зволоження задовільний.

Угіддя характеризується як свіжі злаково-різнотравні луки на дернових та дерново-слабопідзолистих глеуватих піщаних ґрунтах. Фітоценотичний тип – тонкомітлицево-біловусові. Серед рослин переважають біловус, костриця червона, мітлиця тонка та інші. Сіножаті та пасовища середньої якості. Урожайність до 15 ц/га сіна.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs становить 20 кБк/м², рослинності 120 Бк/кг. Середнє забруднення молока ^{137}Cs - 37 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Потребує щорічного поверхневого підживлення.

с. Серники

Випаси: урочища Кустов`є, Пльоси, Виходи, Борова, Мальовка, Дуплиське.

Усі випаси населеного пункту, крім одного, розташовані на заплаві ріки Стир і її притоки ріки Стубла, та на територіях, що до них прилягають. Заплава ріки заливається навесні на тривалий період, що сприяє росту густого та продуктивного травостою, незалежно від погодних умов літнього періоду. Інші пасовища розташовані на східній частині території населеного пункту. Вони менш продуктивні, режим зволоження тут недостатній. Взагалі потреби мешканців в пасовищах забезпечені повністю. Забруднене вище норми молоко постійно надходить з випасу – урочища Кустов`є, що являє собою заболочену заплаву в оточенні лісових ділянок. З останніх – періодично, в залежності від погодних умов, з'являються проби з перевищенням ДР-2006.

урочище Кустов`є

Природне угіддя, що використовуються під випас є заболоченою ділянкою заплави, що поросла лісом. Випасається близько 20 корів з хутора, що знаходиться на відстані близько 3 кілометрів від центру села на південний захід. Урочище має високий продуктивний травостій на протязі усього року. Загальна площа випасу близько 30 га. Ґрунти переважно торфово-болотні. Режим зволоження задовільний.

Угіддя характеризується як вологі та сирі злаково-різнотравні й злаково-осоково-різнотравні луки на торф'яно-болотних ґрунтах. Серед рослин переважають мітлиця повзуча і собача, тонконіг болотяний, різні види осок. Урожайність до 15 ц/га сіна середньої якості. Мозаїчно на всьому угідді зустрічаються западини рельєфу з болотами. В загальній площі вони займають не більше 20 %.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 50 кБк/м², забруднення рослинності - 2050 Бк/кг, забруднення молока в різні роки коливається від 292 до 438 Бк/л. Перевищення ДР -2006 відмічено у всіх пробах.

Можливе докорінне покращення окремих ділянок угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Пльоси

Природне угіддя починається за кілька кілометрів від західної околиці села і розташовується в межиріччі ріки Стир та її правого притока ріки Стубла. Територія навесні повністю затоплюється. Худоба випасається на значній території. Загальна площа угіддя становить не менше 100 га.

Угіддя характеризується як сируваті та сирі різнотравно-злакові й осокові луки на дернових, лучних глейових, супіщаних та суглинкових ґрунтах. Фітоценотичний тип – лисячоосокові, звичайнобекманієві та інші. Серед рослин переважають бекманія звичайна, очеретянка звичайна, мітлиця повзуча та інші. Сіножаті та пасовища доброї та середньої якості. Урожайність до 25 ц/га сіна.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 70 кБк/м^2 , забруднення рослинності - 550 Бк/кг , забруднення молока в різні роки коливається від 56 до 227 Бк/л.

Можливе поверхневе поліпшення угіддя та щорічне підживлення добривами.

пасовище Борова

Культурне пасовище розташоване на заході від села відразу за каналом. Загальна площа пасовища становить 40 га. Типова заплавна ділянка. Пасовище перезалужене і підсіяне культурними травами. За тривалий період після перезалуження відбувається відновлення природних ценозів.

Угіддя характеризується як свіжі злаково-різнотравні луки на дернових та дерново-слабопідзолистих глеуватих піщаних ґрунтах. Фітоценотичний тип – тонкомітлицево-біловусові. Серед рослин переважають біловус, костриця червона, мітлиця тонка та інші. Сіножаті та пасовища середньої якості. Урожайність до 15 ц/га сіна.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 85 кБк/м^2 , забруднення рослинності - 350 Бк/кг , середній вміст радіоцезію в молоці 62 Бк/л . Перевищення ДР-2006 спостерігається в одиничних пробах. Причина – худоба заходить на природні угіддя та в лісові масиви поруч з пасовищем.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів та щорічне підживлення добривами.

пасовище Мальовка

Культурне пасовище розташоване на північному сході від села на колишніх полях сільськогосподарського призначення колективного господарства. Загальна площа угіддя перевищує 100 га. Ґрунти виключно дерново-підзолисті піщані. Режим зволоження задовільний.

Угіддя відноситься до сухих та помірно сухих злаково-різнотравних луків на слаборозвинених дернових і дерново-підзолистих піщаних ґрунтах. Фітоценотичний тип рослинності – пирійно-тонкомітлицеві. Урожайність $5-8 \text{ ц/га}$ сухої маси середньої якості. В засушливі періоди травостій вибивається до дернини. Видовий склад пасовищної рослинності одноманітний. Випас малопродуктивний по причині низької родючості піщаних ґрунтів.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 55 кБк/м^2 , забруднення рослинності - 650 Бк/кг , забруднення молока - 58 Бк/л . Перевищення ДР-2006 не відмічено.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

пасовище Дулиське

Культурне пасовище розташоване на південному сході та на сході від села на меліоративній системі колективного господарства. Останній раз поля переорювалися та відбувався підсів трав до 2000 року. Загальна площа угіддя понад 150 га. Місцями частина полів розорана під городи населення. Худоба випасається на кількох полях системи та вздовж каналу на природних низинних луках.

Угіддя характеризується як сухі та помірно сухі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених дернових і дерново-підзолистих піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах. Урожайність $5-8 \text{ ц/га}$ сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності - пирійно-тонкомітлицеві. Режим зволоження помірний, задовільний. Травостій густий, продуктивний при достатньому зволоженні.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 25 кБк/м^2 , забруднення рослинності - 860 Бк/кг , забруднення молока від 81 до 169 Бк/л . Перевищення ДР-2006 відмічено в 2007 році.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Виходи

Природні угіддя розташовані на північно-західній частині сільської ради на заплаві ріки Стир. Загальна площа пасовища становить 35 га. Угіддя навесні затоплюється на короткий термін. Худоба випасається також по чагарникам та невіддям поблизу заплави в напрямку с. Соломир. На заплаві трапляються пониження з ділянками низинних лук.

Угіддя характеризується як сируваті та сирі різнотравно-злакові й осокові луки на дернових, лучних глейових, супіщаних та суглинкових ґрунтах. Серед рослин переважають бекманія звичайна, очеретянка звичайна, мітлиця повзуча та інші. Сіножаті та пасовища доброї та середньої якості. Урожайність до 15 ц/га сіна середньої якості.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 35 кБк/м^2 , забруднення рослинності - 400 Бк/кг , забруднення молока від 53 до 150 Бк/л . Перевищення ДР-2006 спостерігалось в 2004 році. Причина – худоба заходить на природні угіддя та в лісові масиви поруч з пасовищем.

Можливе поверхневе поліпшення.

Рокитнівський район

с. Березове

Найбільші випаси: урочища Дубова, Тягобне, Бахлицьке, Пилипи, Єльнічк.

Поблизу населеного пункту знаходиться тільки одне культурне пасовище на південно-східній околиці села. Воно використовується для випасання ВРХ колективного господарства. Людська худоба випасається навколо села на природних угіддях, переважно в лісових масивах. На півночі територія випасів обмежена державним кордоном. Території для створення випасів у селищної ради немає.

урочище Дубова

Випас розташований відразу за північною околицею села. Загальна площа угіддя коливається в межах 20-30 га. Випас складається з кількох природних галявин розділених залишками соснових гаїв, чагарників та молоді порослі сосни. На півночі урочище обмежене державним кордоном на сході та заході доходить до каналів, що розділяє його, поля сільськогосподарського призначення та городи місцевого населення.

Відноситься до типу сухих дрібно травних злаково-різнотравних угідь на слаборозвинених піщаних ґрунтах та не задернованих пісках. Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані. Випас розташований на водно-льодовикових відкладах (моренах). Травостій рідко рослий і малопродуктивний. В засушливі періоди вибивається тваринами до ґрунту, дернина практично відсутня. Урожай низькоякісний не перевищує 5 ц/га .

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 35 кБк/м^2 , забруднення рослинності в межах 100 Бк/кг . Середнє забруднення молока коливається в залежності від періоду випасання та метеорологічних умов від 26 до 77 Бк/л . Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Можливе докорінне поліпшення шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Тяжобне

Природне угіддя у вигляді потужного осушеного болота розташоване в 2 кілометрах на північний-схід від населеного пункту. Зальна площа випасу сягає 200 гектарів. Територія угіддя, що використовується під випас ВРХ обмежена на півночі каналом та державним кордоном, інші три сторони обмежуються низькорослими сосновими лісами. Під випас використовується тільки частина болота (кожного року значна територія розорюється місцевими жителями під городи).

Ур. Тяжобне відноситься до типу вологих та сирих злаково-різнотравних й злаково-осокових луків на осушених торф'яно-болотних ґрунтах та торфовищах. Потужний торфований шар сприяє розвитку рослинності. Травостій густий, середньо продуктивний. Режим зволоження задовільний. Урожай 12 -17 ц/га низькоякісного сіна.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 45 кБк/м², забруднення рослинності від 470 Бк/кг і вище. Середнє забруднення молока коливається від 115 до 130 Бк/л (абсолютні величини від 70 до 195 Бк/л). Перевищення ДР-2006 на 20-60% відмічене у 90% усіх проб.

Можливе докорінне поліпшення на більшій частині угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочища Бахлицьке, Пилипи

Природні угіддя в вигляді заболочених територій розташовані на південний-схід від села на відстані 4 кілометри. Прогоном худоба проходить через урочище Пилипи, що представляє собою сосновий бір з невеликими за площею галявинами, переважно сухими.

Галявини класифікуються як свіжі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених піщаних ґрунтах і слабо задернованих пісках. Деякі череди до основного випасу не доходять і випасаються на галявинах, інші - переважно по межі болота, де ґрунти менш вологі. В посушливі періоди ВРХ заходить далі на болото.

Випас характеризується як болотні різнотравно-злаково-осокові та мохово-осокові угіддя на евтотрофних торфовищах. Бахлицький випас становить частину заповідника Сира Погоня і широко використовується під сінокоси. Сіно низької якості з урожайністю 5-12 ц/га. По окраїнах болото частково переходить в низинні луки, які мають значно більшу цінність для випасання, але внаслідок малої площі на загальну продуктивність випасу кардинально не впливають. Загальна площа угідь становить понад 100 гектарів. Ґрунти дерново-підзолисті глеюваті піщані та лучно-болотні в лісовій частині, торфowo-болотні з різним ступенем оглеєння та мулуvато-болотні на масиві заповідника. Режим зволоження задовільний та надмірно вологий. Більшу частину періоду випасання значна площа угіддя вкрита водою. Травостій густий середньо продуктивний.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 25 кБк/м², забруднення рослинності від 360 Бк/кг і вище (поблизу населеного пункту). Середнє забруднення молока 175 Бк/л (коливання від 120 до 250 Бк/л). Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

урочище Єльничек

Природні угіддя у вигляді лісового масиву - сирого субору з вкрапленнями низинних луків, заболочених ділянок та замкнутих блюдець невеликих боліт, розташоване на захід від населеного пункту. Вони простягаються в західному напрямку до 6-7 кілометрів і мають ширину до 2-4 кілометрів. Худоба проходить за день значну відстань лісом затримуючись на луках, галявинах та поблизу заболочених ділянок. Загальна площа випасу не має точного визначення і становить кілька сотень гектарів.

Галявини класифікуються як сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на лучно-болотних, мулуvато-болотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Характеризуються

середньою врожайністю до 15-25 ц/га сіна. Болітця - типові болотні різнотравно-злакові та осокові угіддя, на аналогічних типах ґрунтів зі схожими характеристиками врожайності та низькою якістю сіна. Ґрунти переважно торфово-болотні та торфовища перехідні, зустрічаються вологі субори з дерново-підзолистими глинистими ґрунтами. Режим зволоження задовільний.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 30 кБк/м², забруднення рослинності від 460 Бк/кг і вище. Середнє забруднення молока 260 Бк/л (коливання від 160 до 340 Бк/л). Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

с. Більськ

Випаси: урочища Гребля, Ліс, Жорнівка

Основні випаси населеного пункту можна розділити на дві категорії: розміщені на перелогах в південній частині території населеного пункту та лісові випаси в північній частині.

урочища Гребля, Ліс

Розташовані на північно-східній частині території селищної ради. Угіддя не має чітких контурів і є частиною великого лісу та болота, що до нього примикає. Худоба йде прогоном кілька кілометрів зупиняючись на галявинах та по межі болота.

Болото вкрите водою, непрохідне, худоба частково заходить на нього в періоди посухи. Воно відноситься до типу перехідних та верхових боліт на торф'яно-болотних ґрунтах та торфовищах. По периметру болота розвинені злаково-осокові угіддя, які добре поїдаються тваринами. Урожайність та цінність кормового угіддя низька.

Сосновий бір складається з насаджень сосни і частково залишків природного лісу, трапляються невеликі галявини і заболочені місця - типовий ландшафт поліського лісу. Під випас використовуються просіки, узлісся та заболочені ділянки. Галявини представлені переважно ценозами вологих злаково-різнотравних низинних луків. Ґрунти під насадженнями – дерново-підзолисті глейові піщані, лучно-болотні та болотні, на болоті – торфово-болотні та торф'яні.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs становить 14 кБк/м², рослинності - 1600 Бк/кг. Середнє забруднення молока 155 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

В періоди інтенсивних опадів забруднення рослинності ^{137}Cs збільшується, а під час посухи значно зменшується. Як наслідок, значні коливання забруднення молока корів в різні періоди випасання.

Докорінне поліпшення угіддя неможливе.

пасовище Жорнівка

Пасовище міститься на південь від села. Воно розташоване на перелогах, там де були колишні сільськогосподарські поля з меліоративною системою. Більше десяти років поля угіддя не використовуються за призначенням. Частково окремі ділянки полів розорані місцевим населенням під городи. Має чіткі межі і площу до 50 га.

Ґрунти на різних полях системи трапляються дерново-підзолисті піщані, лучно-болотні та торфовища. Звідси виникають різні типи природних кормових угідь: від свіжих злаково-різнотравних на слабо задернованих пісках до вологих та сирих злаково-різнотравних й злаково-різнотравно-осокових луків на осушених торфовищах. Урожайність 12-16 ц/га сіна низької якості. В періоди тривалої посухи пасовище вибивається худобою до ґрунту, тому худоба частково випасається в навколишніх лісових масивах.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs не перевищує 10 кБк/м², рослинності - 200 Бк/кг. Середнє забруднення молока 40 Бк/л.

Можливе докорінне поліпшення на більшій частині угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

с. Будки Кам'янські

Випаси: урочища Гайков, Піщана, Уprawo

Населений пункт розташований поблизу кордону з Білорусією, тому випаси з північної та східної сторони обмежені кордоном. Єдиний окультурений випас, пасовище Уprawo, розташований на перелогах за два кілометри на південь від села на сільськогосподарських угіддях колишнього колгоспу.

урочища Гайков, Піщана

Природні угіддя, які використовується під випас, являють собою сосново-гарбовий ліс, місцями заболочений, з низкою галявин та замкнутих боліт. Випас обмежений державним кордоном і починається відразу за городами навколо села. Відстань до кордону коливається від кількох сотень метрів до кілометра в північно-західній частині. В західному напрямку худоба вільно переміщається на 3-5 кілометрів. Корови випасаються прогоном переходячи з галявини на галявину. Загальна площа випасу чітко не визначається.

Галявини та узбіччя лісу характеризуються як сирі та мокрі осоково-злакові луки на лучно-болотних та мулуvато-болотних ґрунтах та тимчасово надмірно зволожені луки на дерново-підзолистих, дерново-супіщаних та суглинкових ґрунтах. Урожайність становить 10 -15 ц/га сіна, яке неохоче поїдає худоба. Ґрунти переважно торфово-болотні, місцями дерново-підзолисті піщані. Травостій середньої висоти та густоти. Видовий склад типовий для вказаних типів угідь.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 70 кБк/м², забруднення рослинності поблизу села 650 Бк/кг. Забруднення молока від 80 до 120 Бк/л. Перевищення ДР-2006 від 10% до 20% відмічене в 30% проб.

Докорінне поліпшення угіддя неможливе.

пасовище Уprawo

Пасовище розташоване на перелогах на південному заході від села на колишніх полях колективного господарства вздовж дороги на с. Кам'яне. Загальна площа угіддя не перевищує 35 га. Худоба випасається по черзі на кількох полях системи та частково на навколишніх угіддях. Останній раз перезалужене в 2000 році.

Угіддя відноситься до типу вологих різнотравно-злакових та злаково-осокових луків на слаборозвинених дерново-підзолистих глейових піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах. Урожайність 7-12 ц/га сіна низької якості. Травостій середньо продуктивний. Видовий склад пасовищної рослинності одноманітний.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs не перевищує 35 кБк/м², рослинності - 430 Бк/кг. Середнє забруднення молока 55 Бк/л.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

с. Вежиця

Випаси: урочища Угорне, Довга, Вишенька, Тербча (Гало),

Південна та південно-східна частина угідь де випасаються тварини населеного пункту розташована на землях державного заповідника Сира Погоня – заболоченої ділянки території де острівками трапляються сосново-грабові гаї на піщаних острівках. Дана територія використовується населенням як випаси, і як сінокоси. Західна та північна частина – типові перезволожені низинні луки.

урочище Довга

Природні угіддя, що використовуються під випас, у вигляді заболочених низинних лук з вкрапленнями блюдець боліт, розташовані на захід від села. Угіддя протягуються в напрямку населеного пункту Чермень до 5 кілометрів в довжину і до

3 кілометрів завширшки. Чітко виражених меж випасу немає. Худоба обмежена в пересуванні наявністю водовідвідних каналів, які умовно розділяють різні частини випасу.

Угіддя класифікується як вологі та сирі злаково-різнотравні та злаково-осоково-різнотравні луки на осушених торф'яно-болотних ґрунтах та торфовищах. Урожайність 12-17 ц/га (місцями і вище) низькоякісного сіна. Режим зволоження надмірно вологий. Більшу частину періоду випасу окремі місця угіддя вкриті водою (до 3 місяців). Травостій густий середньо та високопродуктивний.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 50 кБк/м², середнє забруднення рослинності 860 Бк/кг. Середнє забруднення молока 450 - 880 Бк/л (в різні періоди випасання худоби). Значне перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Угорне

Природні угіддя мають аналогічні характеристики з урочищем Довга, оскільки воно є частиною загального заболоченого масиву низинних лук площею близько 400 га розташованого між селами Вежиця та Чермень. Угіддя використовується як випаси для ВРХ вказаних населених пунктів та як сінокоси. Чітко виражених меж випасу немає. Якщо урочище Довга займає північну частину всього угіддя то Угорне становить її південну частину.

Випас класифікується як вологі та сирі злаково-різнотравні та злаково-осоково-різнотравні луки на осушених торф'яно-болотних ґрунтах та торфовищах. Урожайність 12-15 ц/га не досить якісного сіна. Режим зволоження надмірно вологий. Більшу частину періоду випасу окремі місця угіддя вкриті водою. Травостій густий середньо продуктивний.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 35 кБк/м², середнє забруднення рослинності від 940 Бк/кг. Середнє забруднення молока 650 - 840 Бк/л (в різні періоди випасання худоби та в залежності від погодних умов року). Значне перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Вишенька

Природні угіддя, які використовуються для випасання худоби, є типовими ділянками низинних лук з вкрапленням підвищених піщаних островців з типом тимчасово надмірно зволжених лук, розташовані на північний захід від села. Випас протягується в напрямку населеного пункту Переходичі до 2 кілометрів в довжину і до 1 кілометра в ширину. Чітко виражені межі угіддя є з правої сторони, де розміщена осушувальна система колишнього колективного господарства, а нині городи селян. Загальна площа випасу становить близько 100 га.

Угіддя класифікується як вологі злаково-різнотравні луки на дернових та лучних глейових супіщаних ґрунтах. Урожайність до 20 ц/га сіна. Режим зволоження надмірно вологий. Видовий склад пасовищної рослинності різноманітний. Травостій густий середньо продуктивний, до 30 сантиметрів заввишки.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 25 кБк/м², забруднення рослинності до 620 Бк/кг. Середнє забруднення молока в різні роки від 260 до 340 Бк/л. Значне перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочища Теремча (Гало)

Природні угіддя, що використовуються під випас для ВРХ, у вигляді заболочених територій, розташовані на південь і південний-схід від села. Угіддя протягуються в напрямку населеного пункту Єльно в довжину до 20 кілометрів і ширину до 10 кілометрів.

Випас характеризується переважно як болотні різнотравно-злаково-осокові та мохово-осокові угіддя на евтотрофних торфовищах та торф'яно-болотних ґрунтах. Урожайність 5 -12, місцями до 20 ц/га не досить якісного сіна. Худоба випасається неподалік села переважно в східному напрямку заходячи далі на угіддя в міру пониження рівня води на болоті. Угіддя широко використовується під сінокоси. Ґрунти лучно-болотні та торфово-болотні, трапляються дернові оглеєні. Режим зволоження надмірно вологий. Видовий склад пасовищної рослинності одноманітний, переважно різні види осоки.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 35 кБк/м², забруднення рослинності 550 Бк/кг (поблизу населеного пункту). Середнє забруднення молока в різні роки від 485 до 710 Бк/л. Значне перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах

Докорінне поліпшення угіддя неможливе

с. Глинне

Випаси: урочища Острівці, Мостовецьке

Населений пункт розташований на заплаві ріки Ствига, долина якої є основним випасом для поголів'я ВРХ населення. Відкритих площ та ділянок під створення випасів в достатньому обсязі немає. Худоба випасається по лісах та на не угіддях навколо населеного пункту.

урочище Острівці

Пасовище розташоване на заплаві ріки Ствига, що протікає територією населеного пункту. Ширина долини коливається в межах 100 - 200 метрів. Пасовище витягнуте вздовж ріки на відстань понад 4 кілометра. Місцями долина ріки розширюється утворюючи широкі заплавні луки, місцями звужується до сотні метрів.

Угіддя характеризуються переважно як сируваті та сирі злаково-різнотравні й осоково-різнотравні луки на дерново-глейових та торф'яно-болотних ґрунтах, місцями трапляються мокрі злаково-різнотравні луки. Сіножаті та пасовища доброї та середньої якості. Урожайність 10-25 ц/га. Площа пасовища перевищує 40 га. Угіддя ніколи не розорювалося, має типовий набір рослинності заплавних луків. Долина річки складена дерновими оглеєними піщаними, глинисто-піщаними та торфово-болотними ґрунтами. Потужні торфовища утворюють лінзи в пониженнях долини де містяться найбільш продуктивні кормові ділянки випасу. Значна частина випасу вибивається худобою до ґрунту уже в середини пасовищного періоду. Навесні долина на короткий час затоплюється талими водами, оскільки береги ріки не перевищують 2 метрів над рівнем води.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs становить 22 кБк/м², рослинності 450 Бк/кг. Середнє забруднення молока 50 Бк/л, коливається від 45 до 110 Бк/л. Незначне перевищення ДР-2006 відмічене в кількох відібраних пробах.

Можливе докорінне поліпшення більшої частини угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Мостовецьке

Угіддя розташоване на захід від населеного пункту. Включає в себе заболочений лісовий масив площею до 300 га. Худоба йде прогоном туди й у зворотному напрямку кілька кілометрів лісом, випасаючись на галявинах, вирубках та в заболочених пониженнях лісу. За селом ліс місцями вирубаний на 30%. Порослі чагарником ділянки інтенсивно використовуються під випаси.

Угіддя характеризується як сухі та помірно сухі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених дернових і дерново-підзолистих оглеєних піщаних та глинисто-піщаних ґрунтах. Урожайність 5-8 ц/га сіна середньої якості. Рослинність в лісі низько продуктивна. Трапляються ділянки з вологими різнотравно-злаковими та злаково-осоковими луками з врожайністю 7-12 ц/га сіна низької якості. Режим зволоження випасу задовільний.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs коливається від 15 до 25 кБк/м². Середнє забруднення рослинності ^{137}Cs - до 1025 Бк/кг, молока - 150 Бк/л. Перевищення ДР-2006 від 30 до 50% відмічене в усіх відібраних пробах.

Докорінне поліпшення деяких частин угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів можливе тільки в незначних обсягах на невеликих за територією ділянках. Але внаслідок мозаїчності такого випасу вагомого ефекту дані заходи не принесуть.

с. Грабунь

Випаси: урочища Пекчецьке, Кожакове, Хребет

Населений пункт розташований на піщаних водно-льодовикових відкладеннях серед заболоченого лісового масиву. З трьох боків його оточують глибокі болота, майже не прохідні для тварин та людей (заповідник Сира Погоня). Худоба випасається в лісових масивах та частково на болоті, на невеликих за площею осушених ділянках поблизу населеного пункту. Площі для створення культурних пасовищ відсутні.

урочище Пекчецьке

Природні угіддя розташовані на західній частині території сільської ради відразу за околицею населеного пункту. Угіддя не має чітких контурів і є частиною великого болота на якому подекуди трапляються островки соснових борів. Болото частково вкрите водою, місцями непрохідне, худоба випасається на площі близько 100 га, по межах болота на більш сухих місцях, заходячи далі в посушливі періоди або в другій половині вигульного сезону.

Випас характеризується як болотні різнотравно-злаково-осокові та мохово-осокові угіддя на евтотрофних торфовищах. Межі угіддя характеризуються як сирі та мокрі луки на торфово-болотних ґрунтах. Урожайність до 20 ц/га сіна низької якості. Ґрунти лучно-болотні та болотні, місцями трапляються дерново-підзолисті піщані. Рослинність на болоті представлена майже виключно різновидами осоки, одноманітна та малопоживна.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs перевищує 25 кБк/м², рослинності від 965 Бк/кг і вище. Середнє забруднення молока 195 Бк/л, коливається від 130 до 280 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Докорінне поліпшення неможливе.

урочище Кожакове

Природне угіддя на північній частині території населеного пункту. Угіддя не має чітких контурів та великих відкритих площ і простягається на кілька кілометрів на північ де межує з угіддям Лисиче (с. Заболоття). Невеликі за площею відкриті заболочені галявини переходять на північному-заході в масиви боліт.

Угіддя в цілому можна охарактеризувати як болотні різнотравно-злакові та осокові угіддя на лучно-болотних, мулуватоболотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Рослинність на заболочених місцях середньо продуктивна. Урожайність близько 20 ц/га сіна низької якості. Худоба випасається прогоном, без прив'язки до певного місця на великій території.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs становить до 20 кБк/м², середнє забруднення рослинності - 1480 Бк/кг. Середнє забруднення молока - 415 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Докорінне поліпшення неможливе.

урочище Хребет

Природне угіддя розташоване на південній частині території населеного пункту. Угіддя не має чітких контурів (площа майже 200 га) і є частиною великого болота (заповідник Сира Погоня). Худоба випасається на північних межах угіддя Крушинов (с.Хміль). Болото вкрите водою, непрохідне, корови частково заходять на нього в періоди посухи, або випасаються поблизу берегів. До випасу ВРХ проходить близько кілометра сосновим насадженням.

Угіддя характеризується як болотні різнотравно-злаково-осокові та мохово-осокові угіддя на евтотрофних торфовищах, місцями трапляються сирі та мокрі луки на мулуватоболотних ґрунтах. Урожайність випасів 10-15 ц/га низькоякісного сіна. Ґрунти під сосновими насадженнями – дернові оглеєні піщані, на болоті – торфовоболотні. Рослинність на болоті представлена переважно різними видами осоки.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs перевищує 22 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 1200 Бк/кг, молока - 173 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Докорінне поліпшення неможливе.

с. Дроздинь

Випаси: урочища Лючич, Дубники, Лебідь, В'язівно, Курилки, Мутвиця.

Населений пункт розташований поблизу кордону з Білорусією тому північні та східні випаси обмежені кордоном. Культурні випаси, а також великі ділянки відкритих угідь відсутні. Худоба випасається переважно на частково осушених болотах, у заболочених лісах та вздовж шляхів. Існує гостра потреба в випасах.

урочища Лючич, Дубники

Природні угіддя у вигляді потужного болота місцями порослого невисокими соснами, що межують з заболоченими лісовими ділянками, розташовані на північний захід від села і протягуються до 10 кілометрів в довжину і кілька кілометрів в ширину. Загальна площа випасу становить близько 300 га. Худоба проходить угіддям на відстань до 5 кілометрів від населеного пункту. Меж між угіддями немає.

Угіддя характеризується як болотні злакові та осокові луки на торф'яноболотних ґрунтах. В лісах переважають ділянки перезвожжених низинних луків на лучноболотних ґрунтах та блюдце подібні осоково-мохові болота. Урожайність від 5 до 20 ц/га сіна низької якості. Ґрунти переважно торфовоболотні та лучноболотні місцями потужні торфовища. Режим зволоження надмірно вологий. Тривалий час періоду випасання окремі ділянки вкриті водою, особливо в багатоводний або дощовий рік. Травостій густий середньопродуктивний. Видовий склад пасовищної рослинності одноманітний, переважно різні види осоки.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 45 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 2300 Бк/кг, молока - 560 - 830 Бк/л (коливання від 430 до 1225 Бк/л в різні періоди випасання). Значне перевищення ДР-2006 відмічене в усіх без виключення пробах на протязі останніх десяти років спостереження.

Можливе докорінне поліпшення деяких невеликих по площі частин угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів, але в цілому по випасу контрзаходи будуть малоефективними.

урочище В'язівно (Язвіно)

Природні угіддя, що використовуються під випаси, є переважно сосновими борами головним чином природного походження, що містять лінзи потужних низинних боліт. Угіддя протягнулися на південь від села з обох боків дороги на с. Заболоття до 5 кілометрів і обмежені з східної сторони державним кордоном. Худоба йде прогоном в одному напрямку, потім у зворотному. Загальна площа випасу не визначена. Весь лісово-болотний масив має площу до 200 га.

Угіддя характеризуються як сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на лучно-болотних і мулуватоболотних ґрунтах, та тимчасово надмірно зволожені луки на дернових піщаних ґрунтах. Урожайність 8-12 ц/га посереднього та низькоякісного сіна. Ґрунти переважно луково-болотні, подекуди дернові піщані та торф'яно-болотні. Режим зволоження задовільний, в дощові та снігові роки надмірний. Травостій серед лісового масиву рідкий малопродуктивний (місцями відсутній повністю), на болотах досить потужний, але значна частина заболочених ділянок вкрита водою тривалий період.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 50 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 900 Бк/кг, молока - 270 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Докорінне поліпшення неможливе.

урочище Курилки, Лебідь

Природні угіддя у вигляді великих за площею заболочених територій використовуються під випас для ВРХ, розташовані на південний-захід від села на відстані 2-3 кілометри. Від населеного пункту до випасу худоба проходить лісом до 2 кілометрів. Угіддя є частиною заповідника Сира Погоня і широко використовується під сінокоси.

Випас характеризується переважно як болотні різнотравно-злаково-осокові та мохово-осокові угіддя на евтотрофних торфовищах та торф'яно-болотних ґрунтах. Урожайність 5 -12, місцями до 20 ц/га не досить якісного сіна. Ґрунти лучно-болотні та торфово-болотні. Режим зволоження надмірно вологий. Значний час періоду випасання окремі ділянки випасу вкриті водою. Видовий склад пасовищної рослинності одноманітний, переважно різні види осоки.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 85 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 520 Бк/кг, молока - 270 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Докорінне поліпшення неможливе.

с. Єльно

Випаси: урочища Гнойно, Омельно.

Населений пункт розташований на піщаному островку серед заболочених порослих лісом територій. Поблизу села є кілька колишніх сільськогосподарських ділянок (полів), що утворюють випас урочище Омельно з низькопродуктивним рослинним покривом на піщаних ґрунтах. На відстані 7 кілометрів від села на захід знаходиться основний випас худоби урочище Гнойно.

урочище Гнойно

Природні угіддя, що використовуються населенням як сінокоси, випаси та під городи розташовані за 7-10 кілометрів від населеного пункту. Худоба йде прогоном через лісові масиви і заболочені ділянки до основного випасу. Загальна площа під випасами становить 50-60 га. Угіддя відноситься до осушених низинних рівнин. Воно є основним типом кормових угідь для даної місцевості. Угіддя розташовані в плоских пониженнях – депресії з стоячою водою. Характерною їх особливістю є надмірне зволоження за рахунок атмосферних опадів та підтоплення ґрунтовими водами, що

залигають близько до поверхні. Для таких луків характерне весіннє затоплення водою. Ґрунтовий покрив утворений дерновими ґрунтами з різним ступенем оглеєння та опідзолення, луковими, мулуватоболотними, а також торф'яно-глеєвими та торфовими. Рослинність представлена вологолюбивими злаковими травами, осоками, ситниками та різнотрав'ям.

Низинні луки досить продуктивні. Початок вегетації лучної рослинності (1 декада травня) травостій розріджений з проективним покриттям 10-15% представлений переважно молодими листочками видів-домінант. На луках такого типу вже проводиться випасання корів. Види які створюють основу травостою низинних лук в даних екологічних умовах, є інтенсивними акумуляторами ^{137}Cs , який надходить з ґрунту. До таких видів відносяться доміанти та співдомінанти рослинних угруповань низинних лук, такі як осока чорна, щучник дернистий, пахуча трава звичайна, куничник сіруватий, осока пухирчата та інші. У розпал вегетаційного періоду кінець травня проективне покриття травостою збільшується до 85-90%.

На ділянці 25 га, кілька років тому виконано корінне покращення та внесення мінеральних добрив. В зв'язку з відсутністю коштів дана ділянка поступово перероджується і повертається до первинного стану. Ґрунти торфово-болотні, місцями торфовища низинні. Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 110 кБк/м², забруднення рослинності до 3500 Бк/кг, молока - 580 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах на протязі останніх 10 років.

Можливе докорінне поліпшення окремих частин угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів, але в цілому по випасу, як свідчать проведені роботи, контрзаходи приносять короткотерміновий ефект і без підтримки та супроводження і будуть малоефективними.

пасовище Омельно

Пасовище на колишніх сільськогосподарських полях колективного господарства міститься за кілометр на захід від населеного пункту. Загальна площа угіддя не перевищує 30 га. Худоба випасається на одному великому випасі.

Угіддя відноситься до сухих та помірно сухих злаково-різнотравних луків на слаборозвинених дернових і дерново-підзолистих піщаних ґрунтах. Урожайність 5-8 ц/га сухої маси середньої якості. В засушливі періоди травостій вибивається до дернини. Видовий склад пасовищної рослинності одноманітний (повзучопирійні). Випас малопродуктивний по причині низької родючості піщаних ґрунтів.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 35 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 650 Бк/кг, молока від 178 до 436 Бк/л в залежності від періоду випасання. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах на протязі останніх 10 років.

Потребує докорінного покращення та регулювання випасу худоби. Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

с. Заболоття

Випаси: урочища Лисиче, Левочки, Вязівно, Пляшівка

Населений пункт розташований поблизу від державного кордону, який обмежує можливість випасу худоби в північному напрямку. Фактично, випаси, як і території під їх створення поблизу села відсутні. Худоба випасається на невіддях та в лісових масивах. Урочище Пляшівка – це територія навколо городів та хат селян – переважно на північній околиці населеного пункту площею до 2 га.

урочище Лисиче

Природні угіддя в вигляді сосново-березового масиву площею до 200 га, з вкрапленнями вододільних низинних лук та заболочених ділянок порослих грабами, боліт порослих кущами й чагарниками, починається відразу за південно-західною околицею села і протягується на десятки кілометрів. На півдні в 2-3 кілометрах угіддя межує з випасом урочище Єльнічек с.Березове. Худоба прогоном йде в одному напрямку, потім у зворотному, проходить за день велику відстань лісом затримуючись на галявинах та поблизу заболочених ділянок.

Відкриті від лісу частини випасу можна охарактеризувати як сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на лучно-болотних та мулуватоболотних ґрунтах з урожайністю 15-25 ц/га посереднього за якістю сіна. Галявини носять мозаїчний характер. Місцями трапляються ділянки потужних боліт болотно-злакового та осоково-злакового типу. Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані, в лісовій частині, та торфово-болотні в пониженнях і на галявинах. Травостій серед лісового масиву рідкий, малопродуктивний.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 55 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 820 Бк/кг (неподалік населеного пункту), молока - 205 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в 95 % усіх відібраних проб.

Докорінне поліпшення угіддя неможливе.

урочища Левочки, Вязівно

Північно-західна та північна частини території селищної ради поблизу кордону з Білоруссю є переважно залишками городів, чагарниками та частково лісовими ділянками. Левочки (Вязівно) частина заболоченого лісового масиву в західному напрямку від села вздовж дороги на с. Дроздинь протягується до 4 кілометрів в довжину і кілька сотень метрів в ширину. Худоба випасається прогоном. Загальна площа угіддя не перевищує 100 га.

На галявинах, вирубках та узліссях угіддя можна охарактеризувати як сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на лучно-болотних та мулуватоболотних ґрунтах та тимчасово надмірно зволожені луки на дернових піщаних ґрунтах. Урожайність 8-12 ц/га посереднього та поганого за якістю сіна. Травостій серед лісового масиву рідкий малопродуктивний, місцями відсутній практично повністю, особливо в посушливі роки. Худоба в їжу інтенсивно використовує кущові рослини.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 35 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 450 Бк/кг, молока - 75 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Докорінне поліпшення угіддя неможливе.

с. Залав'є

Випаси: урочища Шманиха, Кобила, Калин

Населений пункт розташований на заплаві ріки Ствига. Випаси худоби знаходяться як на заплаві, так і в навколишніх лісах. Чітких меж пасовищ немає, є тільки зазначені природні угіддя що включають в себе болота, ліси та заплавні ділянки. Характеристики усіх урочищ дуже схожі.

урочище Шманиха

Природне угіддя що використовується під випас для однієї череди корів протягується на північний захід вздовж долини ріки Ствига на відстань до 3 кілометрів. Воно починається відразу за городами села і включає в себе заплаву ріки, лісовий масив по лівому березі річки та заболочені ділянки в цьому ж лісі. По правому березі в територію випасу потрапляють ділянки з чагарниками та невіддіддя. Худоба випасається на усіх зазначених вище ділянках. Загальна площа випасу сягає 80 га.

Заплава річки характеризується як свіжі та вологі злакові і злаково-різнотравні луки на дернових та лучних супіщаних і суглинкових ґрунтах. Сіножаті та пасовища середньої та доброї якості з урожайністю 10-25 ц/га. Травостій з різноманітним видовим складом. Серед лісу трапляються галявини та вирубки, які носять мозаїчний характер. Місцями зустрічаються понижені блюдце подібні ділянки боліт болотно-злакового та осоково-злакового типу. Ґрунти під лісом переважно дерново-підзолисті піщані та торфово-болотні в пониженнях і на галявинах.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 22 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 930 Бк/кг, молока - 90 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в 30% відібраних проб.

Докорінне поліпшення угіддя можливе на заплавної ділянці випасу шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів. Потенційно можливе створення довгострокового пасовища з високою врожайністю і високою якістю сіна.

урочище Калин

Природні угіддя площею більше 120 га протягуються на південний-схід та південь вздовж долини ріки Ствига на відстань до 3-5 кілометрів. Вони включають заплаву ріки та лісовий масив по обох берегах річки.

Угіддя на заплаві характеризуються як сируваті та сирі злаково-різнотравні й осоково-різнотравні луки на дерново-глейових та торф'яно-болотних ґрунтах. Сіножаті та пасовища доброї та середньої якості з урожайністю 10-25 ц/га. Потребують доосушення та поверхневого внесення мінеральних добрив. Серед лісу зустрічаються заболочені ділянки низинних лук площею до кількох гектарів. Худоба випасається переважно на узліссі та на заплавних ділянках. Переважають дерново-підзолисті піщані ґрунти, на болотах та в пониженнях торфово-болотні. Травостій середньо продуктивний з різноманітним видовим складом.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 20 кБк/м². Забруднення рослинності від 800 Бк/кг, середнє забруднення молока - 191 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх відібраних пробах.

Докорінне поліпшення угіддя можливе на окремих ділянках заплави шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Кобила

Природне угіддя розташоване на південний-захід населеного пункту вздовж з лівої сторони дороги на смт.Рокитно. Випас протягується на відстань до 3 кілометрів і займає площу 100-150 га. Це сосновий лісовий масив з ділянками густих насаджень штучного походження та галявинами з слабо задернованими боровими пісками, незначними за площею ділянками вирубок та пониженнями погано підходить для випасання худоби. Корови випасаються прогоном.

Галявини характеризуються як свіжі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених піщаних ґрунтах. Як правило це ділянки, де переважають наземнокуничниковий тип рослинності з урожайністю до 16 ц/га сіна низької якості. Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані. Травостій низько продуктивний.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 20 кБк/м². Забруднення рослинності 1950 Бк/кг, середнє забруднення молока - 168 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх відібраних пробах.

Докорінне поліпшення угіддя не можливе.

с. Осницьк

Випаси: урочища Бродок, Льва

Населений пункт розташований в долині ріки Льва серед лісів природного походження. Відкриті території та культурні пасовища відсутні. Худоба випасається в долині ріки та серед лісових масивів.

урочище Бродок

Природні угіддя розташовані на південь від селища за залізничною колією. Угіддя не мають чітких контурів. Типовий ландшафт соснових насаджень - лісові галявини та вирубки, порослі чагарниками є основними випасами для худоби. Заболочених ділянок, не більше 10 % загальної площі у 300 га лісового масиву. Окремі галявини та вирубки порослі травною можна охарактеризувати як нормально та тимчасово підвищено зволожені злаково-різнотравні луки на дернових і дерново-підзолистих глеювато-піщаних та глинисто-піщаних ґрунтах. Урожайність названих угідь не перевищує 5-7 ц/га сіна середньої та низької якості. Узлісся та берег ріки частково характеризуються як свіжі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених і слабо задернованих пісках з урожайністю до 16 ц/га сіна низької якості. Такі ділянки випасу займають теж не більше 10 % території випасу.

Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані. Рослинність низкопродуктивна на більшій території, лише поблизу каналів та в пониженнях середньо продуктивна.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 25 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 560 Бк/кг, забруднення молока коливається в значних межах від 20 до 210 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене у 50% проб молока. Підгодівля худоби вдома чистими кормами, забезпечує одержання молока у межах встановлених нормативів.

Докорінне поліпшення угіддя практично не можливе.

урочище Льва

Випас розташований в заплаві ріки Льва. Ріка протікає територією селищної ради з півдня на північ. Ширина заплавної долини не перевищує 200 метрів, а ріки Льва 10 метрів. Долина річки складена алювіальними ґрунтами. Навесні більша частина долини на короткий термін затоплюється талими водами. Худоба випасається переважно на лівому березі, легко переходячи на правий в окремих місцях заплави.

Угіддя характеризується як сухі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених дернових та дерново-підзолистих піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах. Фітоценотичний тип рослинності відноситься до овечокострицевих. Загалом травостій невисокий (до 15 см) і малопродуктивний. Урожайність пасовища не вище 6-8 ц/га сіна середньої та нижче середньої якості.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 15 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 250 Бк/кг, забруднення молока 33 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Потребує докорінного покращення та регулювання випасу худоби. Можливе докорінне поліпшення на окремих ділянках угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

с. Переходичі

Випаси: урочища Система, Колісець, Острів, Розумова, Дубниця

Населений пункт розташований в рівнинній лісисто-болотистій місцевості. Надмірне зволоження території призвело до значного заболочування навколишніх угідь. Для випасання худоби інтенсивно використовуються значні за територією ділянки низинних лук та болотистих лук, а також залишки меліоративної системи сільськогосподарського призначення.

урочище (Система)

Випас колишніх сільськогосподарських угіддях розташований на північному-заході відразу за селом з правої сторони насипної дороги до с. Будимля. Складається з кількох ділянок перелогів площею по 10 -15 га. розділених каналами. Загальна площа випасу коливається в межах 60 га (корови заходять в ліс яким оточене пасовище на глибину до 500 метрів, частина ділянок розорана під городи селян).

Угіддя характеризується як сухі та помірно сухі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених дернових і дерново-підзолистих піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах. Урожайність 5-8 ц/га сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності - пирійно-тонкомітлицеві. Режим зволоження помірний, задовільний. Травостій густий, продуктивний при достатньому зволоженні. Висота пасовищної рослинності на момент обстеження (червень) становила 10-15 сантиметрів. В засушливі періоди травостій вибивається тваринами до дернини.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 40 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 490 Бк/кг, забруднення молока від 67 до 204 Бк/л в залежності від періоду випасання та погодних умов. Перевищення ДР-2006 відмічене у 2004 році.

Потребує докорінного покращення та регулювання випасу худоби. Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Розумова

Природні угіддя, які використовуються для випасання худоби, є типовими ділянками низинних лук з вкрапленням підвищених піщаних острівців з типом тимчасово надмірно зволжених лук, розташовані на південний схід від села в напрямку с. Вежиця. Загальна площа випасу становить близько 200 га.

Угіддя класифікується як вологі та сирі злаково-різнотравні й злаково-осокові луки на осушених торф'яно-болотних ґрунтах та торфовищах. Фітоценотичний тип дернистоущучникових з домішкою вологолучного різнотрав'я, ситників та осок. Урожайність до 12-17 ц/га сіна низької якості. Режим зволоження надмірно вологий. Травостій густий середньо продуктивний, до 30 сантиметрів заввишки.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 60 кБк/м², забруднення рослинності 1250 Бк/кг. Середнє забруднення молока в різні роки від 390 до 525 Бк/л. Значне перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах

Можливе докорінне поліпшення окремих обмежених ділянок угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Дубниця, Колісець, Острів

Природні угіддя у вигляді значних заболочених територій місцями порослих чагарниками та невеликими групами дерев розташовані за західною околицею села. Угіддя протягуються в напрямку населеного пункту Старе Село в довжину до 5 кілометрів і ширину до 3-5 кілометрів. В північному напрямку розташовані угіддя Колісець та Острів, практично аналогічні за характеристиками. Чітко виражених меж випасу немає. Загальна площа становить близько 200 га.

Угіддя характеризується як сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на лучно-болотних, мулувато-болотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Фітоценотичний тип різнотравно-чорноосокові та різнотравно-собачомітлицеві. Урожайністю 15-25 ц/га сіна низької якості, яку неохоче поїдає худоба. Режим зволоження надмірно вологий. Велику частину періоду випасу ділянка вкрита водою (до 3 місяців). Травостій густий середньо та високопродуктивний, до 50 сантиметрів заввишки.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 105 кБк/м², забруднення рослинності 1940 Бк/кг. Середнє забруднення молока ^{137}Cs в різні роки від 176 до 275 Бк/л. Значне перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах

Можливе докорінне поліпшення лише окремих обмежених ділянок угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

с. Сехи (с. Томашгород)

Випаси: урочища по заплаві ріки Льва

Населений пункт розташований в долині ріки Льва. Більшість випасів для худоби – це – окремі ділянки заплави ріки, що в даний момент не використовуються населенням. Випаси носять мозаїчний характер: складаються з цілинних ділянок і перелогів. Трапляються і вкраплення прируслових понижень та боліт.

урочище Льва

Пасовища населеного пункту розташовані в заплаві ріки Льва. Ріка протікає територією селищної ради з південного-сходу на північний-захід більше 7 кілометрів. Ширина долини коливається від кількох десятків до кількох сотень метрів. Долина ріки інтенсивно розорюється населенням під городи, використовується під сінокоси. Цілинною залишається невелика смужка шириною до 50 метрів вздовж обох берегів річки. Ширина р. Льви не перевищує 10 метрів, тому корови вільно переходять з одного берега на інший. Долина річки складена переважно піщаними ґрунтами, місцями (на північ від села) торфово-болотними та торфовими. Потужні торфовища утворюють незначні за площею лінзи в пониженнях долини. Навесні більша частина долини на короткий термін затоплюється талими водами, оскільки береги ріки не перевищують одного метра над рівнем води. Пасовищні угіддя складаються, як з розораних окультурених ділянок поблизу населеного пункту, так і цілинних ділянок подалі.

Угіддя характеризується як сухі та свіжуваті злакові та злаково-різнотравні, переважно дрібно травні луки на дернових супіщаних та суглинкових ґрунтах. Серед рослин переважають костриці та мітлиці, тонконіг, осока рання. Пасовища середньої якості з урожайністю 8-12 ц/га доброго сіна. Пониження в заплаві ріки – типові низинні луки, але їх доля в загальній площі випасу не перевищує 10% .

На перелогах продуктивність пасовища значно вища. Характеризується як злаково-різнотравні луки на дерново-підзолистих піщаних і супіщаних ґрунтах. Урожайність до 12-15 ц/га посереднього сіна. Підсівом трав та покращенням пасовища населення не переймається. Тут випасається більшість із голів ВРХ населеного пункту. Загалом, єдиний масив пасовища відсутній, худоба проходить угіддями велику відстань, а деякі відрізки долає прогоном.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs становить 17-23 кБк/м², забруднення рослинності від 40 до 340 Бк/кг. Середнє забруднення молока не перевищує 80 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в одиничних пробах. На перелогах перевищення не відмічалось за весь час спостережень.

Можливе докорінне поліпшення лише окремих обмежених ділянок угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

с. Старе Село

Випаси: урочища Терепча, Гало, Вороняче, Чистець, Смоличів, Серендров, Медьоди, Олішон, Лебідь.

Культурні випаси на території селищної ради відсутні. Вся худоба випасається переважно на низинних та заболочених луках природного походження, в заболочених лісових масивах, причому в останніх співвідношення відкритої території до території вкритої лісом коливається досить суттєво. В деяких - ліси займають більшу частину площі, в інших - значно меншу. Важливу роль відіграє господарська діяльність людини.

Усі відкриті ділянки на дерново-підзолистих ґрунтах зайняті під городи. Ліси навколо населеного пункту практично винищені і перетворюються на чагарники та вирубки, місцями вирубки розорюються під городи. Визначення площ деяких випасів досить приблизне і з року в рік зазнає коливань.

урочище Лебідь

Природні угіддя у вигляді потужного болота розташовані на південний-схід від села на відстані біля кілометра. Угіддя є частиною заповідника Сира Погоня і широко використовується під сінокоси. Загальна площа випасу перевищує 100 га і не піддається точному визначенню, оскільки худоба випасається і в навколишніх лісопосадках.

Угіддя відноситься до сирих та мокрих осоково-злаково-різнотравних луків на лучно-болотних, мулуватоболотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Ґрунти дерново-підзолисті піщані в лісовій частині та торфово-болотні з різним ступенем оглеєння на болоті. Режим зволоження надмірно вологий. Значну частину часу періоду випасу ділянка вкрита водою. Урожайність до 15 ц/га низькоякісного сіна, переважно різновидів осокових рослин.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 100 кБк/м^2 , забруднення рослинності 1900 Бк/кг . Середній вміст радіоцезію у молоці в різні роки коливається від 535 до 707 Бк/л. Значне перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Можливе докорінне поліпшення лише окремих обмежених ділянок угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів. Питання покращення випасів ускладнюється внаслідок наявності статусу заповідника для даної території.

урочище Терепча (Гало)

Заболочені низинні луки, що використовуються під випас. Розташовані на південь від села на відстані 1-1,5 кілометри. Цю відстань худоба проходить прогоном через ділянки соснового лісу та городи селян. Угіддя протягуються в напрямку населеного пункту Вежиця де з'єднуються з однойменним урочищем цього населеного пункту. Худоба не заходить далеко і випасається неподалік від межі болота. Територія випасу займає площу біля 200 гектарів. В міру просихання і в залежності від погодних умов конкретного року корови заходять далі вглиб боліт.

Угіддя відноситься до сирих та мокрих осоково-злаково-різнотравних луків на лучно-болотних, мулуватоболотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Фітоценотичний тип рослинності різнотравно-чорноосокові, різнотравно-повзучомітлицеві та різнотравно-собачомітлицеві. Ґрунти торфово-болотні з різним ступенем оглеєння. Режим зволоження надмірно вологий. Більшу частину періоду випасання ділянка вкрита водою (до 3 місяців). Травостій густий середньо та високопродуктивний, до 50 сантиметрів заввишки. Урожайність 15-25 ц/га сіна яке неохоче поїдає худоба.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 90 кБк/м^2 , забруднення рослинності - 1500 Бк/кг (поблизу населеного пункту). Середнє забруднення молока ^{137}Cs в різні роки від 275 до 462 Бк/л. Значне перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах.

Можливе докорінне поліпшення лише окремих обмежених ділянок угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів. Питання покращення випасів ускладнюється внаслідок наявності статусу заповідника для даної території.

урочище Медьоди, Олішон

Угіддя розташовані частково на меліоративній системі на південно-західній околиці населеного пункту і використовуються населенням під городи та випаси худоби. Територія місцями вкрита сосновими лісопосадками, вирубками та

чагарниками. Загальна площа випасу становить близько 40 га. Худоба випасається у лісі та вздовж меліоративних каналів.

Угіддя характеризуються як вологі та сирі злаково-різнотравні й злаково-осоково-різнотравні луки на осушених торф'яно-болотних ґрунтах та торфовищах. Фітоценотичний тип рослинності різні види сіяних травостоїв із значною домішкою ситників та осок. Урожайність 12-17 ц/га посереднього сіна. В лісопосадках та на вирубках рослинність низькопродуктивна.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 20 кБк/м², забруднення рослинності 3100 Бк/кг. Середнє забруднення молока в різні роки від 330 до 431 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах

Можливе докорінне поліпшення лише окремих обмежених ділянок угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочища Смоличів, Серендров

Угіддя розташовані на захід від села вздовж дороги на с. Переходичі. На території випасу подекуди трапляються соснові та грабові гаї. Загальна площа випасу становить близько 80 га.

Угіддя характеризується як сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на лучно-болотних, мулуватоболотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Фітоценотичний тип рослинності переважно різнотравно-чорноосокові. Урожайність 15-25 ц/га сіна, посередньої якості. Значна за площею, найбільш волога частина угіддя, використовується як сінокіс. Режим зволоження надмірно вологий. Травостій густий середньо та високопродуктивний, до 40 сантиметрів заввишки. Випасання відбувається по мірі зниження рівня ґрунтових вод, тобто носить подекуди мозаїчний характер – окремі ділянки вибиваються худобою до ґрунту, інші – залишаються незаймані.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 25 кБк/м², забруднення рослинності 2450 Бк/кг. Середнє забруднення молока ^{137}Cs - 310 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх пробах

Докорінне поліпшення можливе лише окремих обмежених ділянок угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Вороняче

Велика заболочена територія місцями вкрита лісовими ділянками розташована на північ від села. Загальна площа випасу становить близько 200 га. Худоба проходить угіддям на відстань до 5 кілометрів від населеного пункту.

Угіддя має схожі характеристики з іншими урочищами і відноситься до сирих та мокрих осоково-злаково-різнотравних луків на лучно-болотних, мулуватоболотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Фітоценотичний тип угідь різнотравно-собачомітлицеві та різнотравно-чорноосокові. Урожайність 15-25 ц/га посереднього за якістю сіна. Режим зволоження надмірно вологий. Тривалий час періоду випасу окремі частини ділянки вкриті водою. Травостій густий середньо та високопродуктивний, до 30 сантиметрів заввишки.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 40 кБк/м², забруднення рослинності 1400 Бк/кг. Середнє забруднення молока коливається від 416 до 600 Бк/л в залежності від періоду обстеження. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх відібраних пробах

Докорінне поліпшення можливе лише окремих обмежених ділянок угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Чистець

Природні угіддя у вигляді заболоченого сосново-березового лісу з болотистими галявинами та потужними болотами розташовані на північний-схід та схід від села і протягуються до 8 кілометрів в довжину і кілька кілометрів в ширину. Загальна площа випасу становить близько 250 га.

Угіддя характеризується як болотні злакові та осокові луки на торф'яно-болотних ґрунтах. В лісах переважають ділянки перезвожених низинних луків на лучно-болотних ґрунтах та блюдце подібні осоково-мохові болота. Урожайність до 20 ц/га сіна низької якості. Ґрунти переважно торфово-болотні та лучно-болотні місцями потужні торфовища. Режим зволоження надмірно вологий. Тривалий час періоду випасання окремі ділянки вкриті водою, особливо в повноводний або дощовий рік. Травостій серед лісу рідкий, місцями відсутній, на галявинах та болотах середньо продуктивний. Видовий склад пасовищної рослинності одноманітний, переважно різні види осоки.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 35 кБк/м², забруднення рослинності 1800 Бк/кг. Середнє забруднення молока становить 367 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх відібраних пробах

Докорінне поліпшення угіддя неможливе.

сmt Томашгород

Випаси: урочища Ломське, Крута Слобода, Віткове, Колодинець

Населений пункт розташований серед лісового масиву. Культурні випаси для ВРХ відсутні. Господарська діяльність людини навколо села (гранітні кар'єри, залізничні колії, шляхи та відвали переробних заводів) привела до змін природних ландшафтів та угідь на техногенні. Худоба випасається по лісах, навколо кар'єрів, на вирубках на серед чагарників.

урочище Ломське

Природне угіддя розташоване на північно-східній частині території селищної ради. Угіддя не має чітких контурів і великих відкритих площ. Загалом, масив угіддя має вигляд квадрата із стороною до 2 кілометрів. Невеликі до 10 соток галявини і понижені місця в рідколіссі та серед чагарників - типовий ландшафт поліського лісу. Трапляються виходи на поверхню гранітних останців.

На лісових галявинах та узліссі поширені сухі злаково-дрібнотравні угіддя, з низькою якістю та врожайністю до 5 ц/га сіна. Зустрічаються ділянки низинних лук злаково-різнотравні на дернових та лучних ґрунтах з урожайністю до 10-15 ц/га посереднього за якістю сіна. Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані. Рослинність на заболочених місцях густа та продуктивна, в рідколіссі - переважно бруснично-чорничні зарості. Подекуди худоба заходить на незначні за площею ділянки покинутих городів, перелоги. Худоба випасається прогоном, без прив'язки до певного місця на великій території. В окремі періоди пасовищного сезону корови виходять випасатися на заплаву ріки Льва. Заплава характеризується як свіжі та вологі злакові та злаково-різнотравні луки на дернових та лучних супіщаних і суглинкових ґрунтах. Пасовища середньої якості. Урожайність 10-20 ц/га

Забруднення ґрунту ^{137}Cs становить 45 кБк/м², забруднення рослинності до 500 Бк/кг. Середнє забруднення молока ^{137}Cs коливається від 56 до 101 Бк/л в різні роки. Перевищення ДР-2006 відмічається при певних погодних умовах в 20% проб.

Докорінне поліпшення угіддя неможливе.

урочище Крута Слобода

Природне угіддя розташоване поблизу хутора Крута Слобода за його північною околицею. Угіддя не має чітких контурів і великих відкритих площ. Загалом, масив угіддя витягнутий у напрямку с. Клесів, де межує з місцевим угіддям Мостище. Чіткої

межі між угіддями не існує. Худоба обох населених пунктів випасається на одній площі до 200 га. Типовий ландшафт соснових насаджень з останцями природного лісу. Трапляються відкриті заболочені площі (в північній частині початок меліоративного каналу), порослі чагарниками та травою вирубки і галявини.

Відкриті ділянки можна охарактеризувати як сухі дрібно-травні злаково-різнотравні угіддя на слаборозвинених піщаних ґрунтах і не задернованих пісках. Корм низької якості. Урожайність 3-5 ц/га сіна. Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані, дернові та лучні в пониженнях. Режим зволоження задовільний. Рослинність в пониженнях на ділянках низинних лук густа та продуктивна, на вирубках та галявинах - низькопродуктивна. Худоба випасається прогоном, без прив'язки до певного місця на великій території.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs становить 70 кБк/м^2 , забруднення рослинності від 850 Бк/кг. Середнє забруднення молока ^{137}Cs від 237 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене у всіх відібраних пробах.

Докорінне поліпшення угіддя не можливе.

урочище Віткове

Угіддя розташоване на південь від селища за залізничною колією. Воно не має чітких контурів. За 2-3 кілометри від околиці села починається велика відкрита ділянка частково розорана під городи, частково використовується як випас.

Відкрита площа випасу коливається в межах 20 гектарів. Цю ділянку можна охарактеризувати як вологі різнотравно-злакові та злаково-осокові луки на слаборозвинених дерново-підзолистих глейово-піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах. Урожайність 7-12 ц/га сіна низької якості. Трапляються лінзи потужних торфовищ з низинними луками. Основний час худоба випасається саме тут, проходячи першу частину угіддя прогоном. Ґрунти під сосновими насадженнями переважно дерново-підзолисті піщані. Рослинність на заболочених ділянках густа та продуктивна, а в лісовій частині зустрічається переважно поблизу доріг та на галявинах.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs становить 35 кБк/м^2 , забруднення рослинності від 1840 Бк/кг. Середнє забруднення молока ^{137}Cs від 146 до 254 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене у 95% всіх відібраних проб.

Докорінне поліпшення угіддя можливе лише на окремих незначних по площі ділянках.

урочище Колодинець

Угіддя розташоване на південь від селища за залізничною колією напроти села Крута Слобода у вигляді посадок сосни. Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані. Рослинність на понижених ділянках густа та продуктивна, а в лісовій частині зустрічається переважно поблизу доріг та на галявинах. Лісові галявини та вирубки, порослі чагарниками є основними випасами для худоби. Худоба випасається прогоном.

Галявини та вирубки характеризуються як нормально та тимчасово підвищено зволожені злаково-різнотравні луки на дернових і дерново-підзолистих глеювато-піщаних та глинисто-піщаних ґрунтах. Урожайність названих угідь не перевищує 5-7 ц/га сіна низької якості. Узлісся характеризуються як свіжі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених і слабо задернованих пісках з урожайністю до 16 ц/га сіна низької якості. Такі ділянки випасу займають не більше 20 % території випасу.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs становить 55 кБк/м^2 , забруднення рослинності 1650 Бк/кг. Середнє забруднення молока ^{137}Cs від 158 до 302 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх відібраних пробах.

Докорінне поліпшення угіддя не можливе.

с. Хміль

Випаси: урочища Крушинов, Ріка, Лизинда

Населений пункт розташований серед лісових масивів в долині ріки Ствига. Культурні пасовища відсутні. Худоба випасається на болотах, в лісах та частково в долині ріки.

урочище Крушинов

Природне угіддя розташоване на північно-західній частині території селищної ради. Угіддя не має чітких контурів і є частиною великого болота (заповідник Сира Погоня). Болото вкрите водою, непрохідне, худоба частково заходить на нього в періоди посухи, або випасається поблизу берегів. До випасу худоба проходить близько 2 кілометрів сосновим насадженням.

Угіддя характеризується як заболочені луки сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на мулуватоболотних ґрунтах. Рослинність на болоті представлена переважно різновидами осоки. Сінокісно-пасовищні угіддя з урожайністю 15-25 ц/га сіна низької якості. Береги болота – смужка низинних злаково-різнотравних лук на лучних та дерново-підзолистих ґрунтах мають дуже обмежену територію і займають менше 10% загальної площі випасу. На лісових галявинах та вздовж доріг і просік поширені сухі злаково-дрібнотравні угіддя, з низькою якістю та урожайністю до 5 ц/га сіна. Худоба випасається прогоном, без прив'язки до певного місця на великій території на площі більше 200 га.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs становить 30 кБк/м², забруднення рослинності 1550 Бк/кг. Середнє забруднення молока - 235 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх відібраних пробах.

Докорінне покращення угіддя не можливе.

урочище Ріка

Пасовище розташоване на заплаві ріки Ствига на південному-сході від населеного пункту. Ріка протікає за 2 кілометри від села. До річки худоба проходить сосновими насадженнями. Ширина долини коливається в межах від десятків до кількох сотень метрів. Площа пасовища сягає 60 га., воно протягується вздовж річки до 3 кілометрів. Угіддя ніколи не розорювалося, має типовий набір рослинності заплавної луки. Значна частина площі випасу (до 20%) заросла не їстівними видами рослинності, місцями заболочена. Потужні торфовища утворюють лінзи в пониженнях долини. Навесні більша частина долини на короткий термін затоплюється талими водами, оскільки береги ріки не перевищують 2 метрів над рівнем води.

Угіддя характеризується як свіжі та вологі злакові та злаково-різнотравні луки на дернових та лучних супіщаних і суглинкових ґрунтах. Пасовища середньої якості. Урожайність 10-20 ц/га.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs не перевищує 15 кБк/м², забруднення рослинності 1250 Бк/кг. Середнє забруднення ^{137}Cs молока - 93 Бк/л, коливається в межах від 50 до 170 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в 30% усіх відібраних проб.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Лизинда

Природне угіддя розташоване на південній частині села. Угіддя не має чітких контурів. Худоба випасається прогоном у лісовому масиві вздовж каналів та на галявинах на площі близько 100 га. Лісовий масив складається з насаджень сосни, заболочених блюдце подібних понижень, просік та галявин. Відкритих площ практично немає.

На лісових галявинах та вдовж доріг і просік поширені сухі злаково-дрібнотравні угіддя на дерново-підзолистих піщаних ґрунтах з низькою якістю та урожайністю до 5 ц/га сіна. Понижені частини випасу - низинні та заболочені луки.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs не перевищує 20 кБк/м², рослинності 1000 Бк/кг. Середнє забруднення молока - 215 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх відібраних пробах.

Докорінне поліпшення угіддя неможливе.

Сарненський район

с. Карпилівка

Випаси: урочища Луг (заплава р. Горинь), Отбой, Люхотське

Населений пункт розташований в заплаві р. Горинь, на її правій стороні. Заплавні луки на алювіальних відкладах складені піщаними ґрунтами з локальними вкрапленнями лучних та торф'яно-болотних в пониженнях рельєфу, і займають значні площі. Випасами ВРХ забезпечена повністю.

урочище Луг (заплава р. Горинь)

Природні угіддя починаються відразу за західною околицею села і протягується вздовж ріки Горинь на північ до п'яти кілометрів в довжину та кілька кілометрів в ширину. Заплава навесні повністю затоплюється талими водами. Берег річки не високий, тому мають місце підтоплення заплави в літньо-осінній період при інтенсивних опадах. Худоба випасається на значній території. Загальна площа угіддя становить близько 300 га.

Угіддя характеризується як свіжі та вологі злакові і злаково-різнотравні луки на дернових та лучних суглинкових ґрунтах. Серед рослин переважають костриця валіська, мітлиця виноградова, тонконіг вузьколистий. Урожайність до 12 ц/га сіна середньої якості. Мозаїчно по всій долині трапляються западини рельєфу з перезволоженими луками. В загальній площі вони займають не більше 10-15 %.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 34 кБк/м², забруднення рослинності - 100 Бк/кг, забруднення молока - 33. Перевищення ДР -2006 не відмічено за всі роки спостережень.

На більшій частині заплави можливе докорінне покращення випасу, створення сіяних угідь з щорічним підживленням мінеральними добривами.

В осінній період використовується під випас урочище Люхотське, що розташоване дещо південніше села на заплаві і має аналогічні характеристики.

урочище Отбой

Природні угіддя, що використовується під випас для однієї череди корів - є сосновий субір, який перетинають кілька каналів порослих кущами та чагарниками. Угіддя починається за 1 кілометр від східної околиці села і протягується в східному напрямку до с. Рудня Карпилівська. Худоба прогоном йде в одному напрямку, потім у зворотному - затримуючись на галявинах, вирубках та поблизу каналів. Загальна площа випасу не визначена.

Відкриті частини випасу можна охарактеризувати як сухі та помірно сухі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених дернових та дерново-підзолистих піщаних ґрунтах. Урожайність випасів 5-8 ц/га сухої маси середньої якості. Рослинність в лісі низько продуктивна. Понижені ділянки характеризуються як тимчасово надмірно зволожені луки на дерново-підзолистих ґрунтах. Урожайність таких ділянок до 8-10 ц/га сухої маси задовільної якості.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 65 кБк/м^2 , забруднення рослинності - 1020 Бк/кг , забруднення молока - 228. Дворазове перевищення ДР -2006 відмічено у всіх пробах.

Докорінне покращення угіддя неможливе.

с. Рудня Карпилівська

Випаси: урочища Болото (Кружок), Став

Населений пункт знаходиться в лісовому масиві. В наявності один культурний випас - пасовище Став розташоване на сільськогосподарських угіддях де випасається одна череда, інші ходять по лісах та болотах в північному та в північно-західному напрямку від села. Пасовище переорювалося останній раз до 2000 року і було підсіяне травами.

урочище Болото (Кружок)

Природні угіддя що використовуються під випас включають в себе соснові ліси з вкрапленням заболочених ділянок та значних по території боліт. Відразу за північною околицею села худоба входить в лісовий масив і прогоном йде 3-5 кілометрів до ділянок зайятих болотами де переважно і випасається, якщо ділянки не залиті водою. Загальна площа випасу не визначена, болота займають не менше 20-30 га. Крім боліт в лісах трапляються в достатній кількості відкриті ділянки низинних та перезвожених луків. Травостій серед лісового масиву рідкий, на болотах та луках досить продуктивний і густий.

Угіддя характеризується як сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на лучно-болотних, мулуватоболотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Фітоценотичний тип різнотравно-чорносокові та різнотравно-собачомітлицеві. Врожайність $15-25 \text{ ц/га}$ сіна низької якості, яку неохоче поїдає худоба. Режим зволоження надмірно вологий. Велику частину періоду випасання ділянка вкрита водою (до 3 місяців). Травостій густий середньо та високопродуктивний, до 30 сантиметрів заввишки.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 25 кБк/м^2 , забруднення рослинності 2200 Бк/кг , забруднення молока ^{137}Cs коливається в різні роки спостережень від 85 до 444 Бк/л . Перевищення ДР -2006 відмічено в 2004 та 2006 роках. Останні два роки забруднення знаходиться на межі допустимих рівнів.

Докорінне поліпшення не можливе.

урочище Став

Культурне пасовище розташоване на полях сільськогосподарського призначення на південній околиці населеного пункту. Пасовище має видовжену з півдня на північ форму і розміщується все на правій стороні меліоративного каналу. З іншого боку розташований ліс. Худоба випасається на території площею до 20 гектарів.

Угіддя відноситься до сухих та помірно сухих злаково-різнотравних луків на слаборозвинених дернових і дерново-підзолистих піщаних ґрунтах. Врожайність $5-8 \text{ ц/га}$ сухої маси середньої якості. В засушливі періоди травостій вибивається до дернини. Видовий склад пасовищної рослинності одноманітний. Випас малопродуктивний по причині низької родючості піщаних ґрунтів.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 50 кБк/м^2 , забруднення рослинності до 1350 Бк/кг , забруднення молока ^{137}Cs коливається в різні роки спостережень від 67 до 220 Бк/л . Перевищення ДР -2006 відмічено в 2004 та 2006 роках. Останні два роки спостережень перевищень не відмічено.

Потребує докорінного поліпшення та регулювання випасу худоби. Можливе поверхнєве і докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

с. Клесів

Урочища: Мостище, Баньки

Населений пункт розташований на північній околиці селища міського типу з одноіменною назвою. Культурні випаси відсутні. В наявності невіддільна навколо села та кілька природних угідь, що використовуються під випаси на відстані 2-4 кілометри. Загалом - це лісові масиви та болотисті ділянки. Площ сільгоспугідь для створення культурних пасовищ навколо населеного пункту немає.

урочище Мостище

Природні угіддя розташовані відразу за східною околицею населеного пункту і становить собою сосновий бір з вкрапленнями відкритих ділянок. Загалом, масив угіддя витягнутий у напрямку с. Крута Слобода. Чіткої межі між угіддями різних населених пунктів не існує, по суті це є одне велике угіддя, площею до 200 га, що використовується жителями обох сіл.

Типовий ландшафт соснових насаджень з останцями природного лісу. Трапляються відкриті заболочені площі (в північній частині початок меліоративного каналу), порослі чагарниками та травною вирубки і галявини. Відкриті ділянки можна охарактеризувати як сухі, дрібно травні, злаково-різнотравні угіддя на слабо розвинених піщаних ґрунтах і не задернованих пісках. Корм низької якості. Урожайність 3-5 ц/га сіна. Практично не реагують на заходи щодо поліпшення. Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані під лісом, дернові та лучні в пониженнях. Режим зволоження задовільний. Рослинність в пониженнях на ділянках низинних лук густа та продуктивна, на вирубках та галявинах - низькопродуктивна. Худоба випасається прогоном, без прив'язки до певного місця на великій території.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs становить 20 кБк/м², забруднення рослинності від 1050 Бк/кг. Середнє забруднення молока ^{137}Cs від 256 до 418 Бк/л в різні роки спостережень. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх відібраних пробах.

Докорінне поліпшення угіддя не можливе.

урочище Баньки

Природні угіддя що використовуються під випас включають в себе соснові ліси з вкрапленням понижених і заболочених ділянок та незначних по території боліт. Відразу за північною околицею села худоба входить в лісовий масив і прогоном йде 2-3 кілометри до відкритих ділянок боліт де переважно і випасається. Загальна площа випасу не визначена, болота займають не менше 40 га. Крім боліт в лісах трапляються в достатній кількості ділянки низинних та перезволожених луків. Травостій серед лісового масиву рідкий, а на болотах та луках досить продуктивний і густий.

Угіддя характеризується як сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на лучно-болотних, мулуватоболотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Фітоценотичний тип різнотравно-чорноосокові та різнотравно-собачомітлицеві. Урожайність 15-25 ц/га сіна низької якості, яку неохоче поїдає худоба. Режим зволоження надмірно вологий. Велику частину періоду випасання ділянка вкрита водою.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 65 кБк/м², забруднення рослинності 1200 Бк/кг, середній вміст радіоцезію у молоці коливається в різні роки спостережень від 206 до 288 Бк/л. Перевищення ДР -2006 відмічені в усіх відібраних пробах.

Докорінне поліпшення не можливе.

с. Пугач

Населений пункт розташований серед лісового масиву та обмежений гранітними кар'єрами та кар'єрами під розробку бурштину. Промислова діяльність знищила майже усі навколишні території, які можна використовувати під випаси худоби. Єдиний випас

- урочище Кремно, представляє собою сосново-грабовий ліс з вкрапленням відкритих ділянок низинних лук та боліт поблизу меліоративного каналу.

урочище Кремно

Природні угіддя у вигляді сосново-грабового лісового масиву розташовані на захід та північ від західної околиці населеного пункту і протягуються до 5 кілометрів в довжину і до двох кілометрів в ширину. Загальна площа випасу становить близько 200 га. Худоба проходить угіддям на відстань до 5 кілометрів від населеного пункту затримуючись на галявинах та поблизу меліоративного каналу, що пересікає урочище з півдня на північ. Ґрунти дерново-підзолисті піщані, місцями торфово-болотні.

Угіддя на відкритих заболочених ділянках характеризується як сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на лучно-болотних, мулуватоболотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Фітоценотичний тип різнотравно-чорноосокові та різнотравно-собачомітлицеві. Урожайність 15-25 ц/га не якісного сіна, яке неохоче поїдає худоба. Режим зволоження надмірно вологий. Під лісом трапляються переважно сухі дрібно травні злаково-різнотравні угіддя на слаборозвинених піщаних ґрунтах і не задернованих пісках. Корм низької якості. Урожайність 3-5 ц/га сіна.

Значна територія угіддя понівечена внаслідок роботи старательських бригад (особливо ліва сторона випасу), що знищують верхній шар ґрунту і рослинний прокрив. Режим зволоження надмірно вологий. Деякий час періоду випасу окремі ділянки вкриті водою.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 45 кБк/м^2 , забруднення рослинності 620 Бк/кг (поблизу населеного пункту), забруднення молока до 300 Бк/л. Перевищення ДР -2006 відмічені в усіх відібраних пробах. Окремі проби із значенням менше ДР пояснюються випасанням корів на полях поблизу городів та домашньою підгодовлею тварин чистими кормами.

Докорінне поліпшення не можливе.

с. Федорівка

Випаси: урочища Волосень, За кладовищем та Міжпоросля

Населений пункт має в достатній кількості поля та відкриті ділянки території для створення й покращення культурних пасовищ. Лише один випас розташований в лісі і використовується в окремі роки в залежності від погодних умов.

урочище Волосень

Розташоване на захід від села відразу за його околицею. Угіддя не має чітких контурів і великих відкритих площ. Невеликі низькопродуктивні площі на піщаних ґрунтах поблизу села плавно переходять в природний ліс. Худоба йде прогоном через лісовий масив, затримуючись на галявинах. В пониженнях лісу трапляються заболочені площі, порослі чагарниками вирубками.

Галявини та узбіччя лісу характеризуються як сирі та мокрі осоково-злакові луки на лучно-болотних та мулуватоболотних ґрунтах, та тимчасово надмірно зволожені луки на дерново-підзолистих, дерново-супіщаних та суглинкових ґрунтах. Урожайність названих угідь становить 10 -15 ц/га сіна, яке неохоче поїдає худоба.

Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані, подекуди торфово-болотні. Режим зволоження задовільний.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 80 кБк/м^2 , забруднення рослинності 365 Бк/кг. Середнє забруднення молока ^{137}Cs коливається від 91 до 114 Бк/л. Перевищення ДР-2006 відмічене у 20% усіх проб в 2008 році.

Докорінне поліпшення угіддя не можливе.

пасовище За кладовищем

Пасовище починається відразу за східною околицею і тягнеться на схід та на південь до штучних ставів. Угіддя має чіткі контури і площу близько 20 га. Воно розташоване частково на перелогах полів сільськогосподарського призначення, які виведені з обігу та на цілинних ділянках навколо ставів. На території пасовища трапляються ділянки зайняті гранітними валунами та чагарниками (до 15%). Останнім часом значна територія пасовища заростає мало їстівними видами трави (ситником).

Угіддя характеризується як сухі та помірно сухі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених дернових, дерново-підзолистих піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах, з урожайністю 5-8 ц/га сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності - пирійно-тонкомітлицеві. Режим зволоження помірний, задовільний. В засушливі періоди травостій вибивається тваринами до дернини.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 45 кБк/м², забруднення рослинності 170 Бк/кг. Середнє забруднення молока 29 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Міжпоросля

Культурне пасовище на північній частині території населеного пункту. Угіддя має чіткі контури і площу близько 15 га. Воно розташоване на переораних полях сільськогосподарського призначення, які виведені з обігу. Оранка і підсіювання трав останній раз проводилися до 2000 року. Ґрунти виключно дерново-підзолисті піщані.

Угіддя характеризується як сухі та помірно сухі злаково-різнотравні луки на дерново-підзолистих піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах, з урожайністю 5-8 ц/га сіна середньої якості. Фітоценотичний тип рослинності - пирійно-тонкомітлицеві. Рослинність низькопродуктивна, одноманітна, представлена одним-двома рослинами домінантами. В засушливі періоди травостій вибивається до мінеральної частини.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 50 кБк/м², забруднення рослинності 40 Бк/кг. Середнє забруднення молока ^{137}Cs 18 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Можливе докорінне поліпшення угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів.

с. Галузія

Випаси: урочища Оптова (Чоботи), Застав, Голя, Засернюха (Ячиння), Пастовень, Кривенське.

Усі випаси можна розділити на дві категорії - розташовані на колишніх сільгоспугіддях та серед лісу. Причому, лісові випаси розташовані переважно на торфових ґрунтах, а культурні – на дерново-підзолистих піщаних.

урочище Оптова (Чоботи)

Природні угіддя, що використовуються під випас включають в себе сосново-грабові ліси з вкрапленням ділянок низинних лук та заболочених ділянок. Розташовані на відстані 2-3 кілометрів на північний схід від села. Худоба випасається лісом та болотами в межах 3-5 кілометрів від села. Загальна площа випасу близько 120 га, болота займають не менше 30-40% території. Шляхом до угіддя худоба проходить покинуті поля сільськогосподарського призначення урочище Чоботи (10-12 га) - сухі злаково-різнотравні луки на слабо задернованих пісках, малопродуктивний випас на дерново-підзолистих піщаних ґрунтах. Перелоги давно виведені з обороту і не використовуються навіть під городи внаслідок низької родючості.

Ґрунти під лісами дерново-підзолисті піщані, на болотах - торфово-болотні. Режим зволоження задовільний. Травостій серед лісового масиву рідкий, на болотах

досить продуктивний. Угіддя характеризуються як вологі та сирі злаково-різнотравні й злаково-різнотравно-осокові луки на лучно-болотних, мулувато-болотних та торф'яно-болотних ґрунтах. Урожайність 12-20 ц/га сіна низької якості.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs становить 25 кБк/м², рослинності - 650 Бк/кг (неподалік населеного пункту). Середнє забруднення молока ^{137}Cs в різні роки спостережень та в залежності від погодних умов й часу відбору коливається від 43 до 125 Бк/л.

Можливе докорінне поліпшення деяких частин та ділянок угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Засернюха (Ячиння)

Природні угіддя розташовані на північний-схід від села. Угіддя не мають чітких контурів. Загальна площа масиву близько 40 га. Лісові галявини та відкриті понижені ділянки лук є основними випасами для худоби. Заболочених ділянок не багато, не більше 10 % загальної площі. Трапляються меліоративні канали та струмки. Галявини характеризуються як вологі та сирі злаково-різнотравні луки на торф'яно-болотних ґрунтах та торфовищах. Урожайність названих угідь не перевищує 12-17 ц/га сіна середньої та низької якості. Береги струмків та меліоративних каналів характеризуються як сирі та мокрі осоково-злаково-різнотравні луки на торф'яно-болотних ґрунтах з урожайністю до 25 га сіна низької якості.

Ґрунти переважно торф'яно-болотні та торфовища. Рослинність середньо продуктивна на більшій території.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 35 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 470 Бк/кг, середнє забруднення молока коливається в межах від 89 до 93 Бк/л в різні періоди відбору. Відмічене перевищення ДР-2006 в кількох пробах до 130 % від норми.

Докорінне поліпшення угіддя практично не можливе.

урочища Застав, Голя

Пасовища на перелогах розташовані на заході від села на колишніх полях колективного господарства. Меліоративна система створена близько 20 років тому знаходиться в задовільному стані, і забезпечує нормальний дренаж полів випасу. Загальна площа пасовища становить близько 100 га, урочище Голя є південно-західною частиною загального пасовища (кілька полів серед лісу до 40 га). Худоба випасається по черзі на кількох полях та частково на навколишніх угіддях. Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані, місцями вкращення торфових та лучних.

Угіддя характеризується як сухі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених дернових та дерново-підзолистих, піщаних і глинисто-піщаних ґрунтах. Фітоценотичний тип рослинності одноманітний відноситься до пирійно-тонкомілицевих. Переважають декілька видів рослин. Загалом травостій невисокий (до 10 см) і малопродуктивний. Урожайність пасовища не вище 6-8 ц/га сіна середньої та нижче середньої якості. В дощові роки продуктивність пасовища значно збільшується, в посушливі воно вибивається тваринами до мінеральної частини ґрунту.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 30 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 100 Бк/кг, середнє забруднення молока значно нижче ДР-2006, не перевищує 50 Бк/л в різні періоди відбору.

Потребує докорінного покращення шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів та регулювання випасу худоби.

урочище Кривенське

Природні угіддя у вигляді низинних лук розташовані на півдні від села за кілька кілометрів на заплаві невеликого струмка, що впадає в озеро неподалік населеного

пункту. Ширина долини струмка не перевищує сотень метрів. Загальна площа випасу становить близько 20 га. Худоба випасається вздовж каналу та частково заходить до лісу. Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані з вкрапленням торфових. Угіддя характеризується як тимчасово надмірно зволожені луки на дерново-підзолистих супіщаних та суглинкових ґрунтах. Фітоценотичний тип рослинності відноситься до тонкомітлицево-щучних та пирійно-тонкомітлицевих. Урожайність пасовища не вище 8-10 ц/га сіна середньої якості.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 25 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 170 Бк/кг, середнє забруднення молока не перевищує 38 Бк/л.

Можливе докорінне покращення окремих ділянок випасу шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Пастовень

Пасовище розташоване на перелогах за північною околицею села на колишніх полях місцевого колгоспу. Останній раз поля переорювалися до 2000 року, відтоді випас заріс травой. Загальна площа пасовища становить близько 15 га. Худоба випасається на полях та вздовж них в чагарниках з порослю берези. Ґрунти - потужні торфовища: місцями осушені, місцями заболочені внаслідок погіршення дренажної системи.

Угіддя характеризується як вологі та сирі злаково-різнотравні луки й злаково-осокові луки на осушених торф'яно-болотних ґрунтах. Фітоценотичний тип рослинності різнотравно-повзучомітлицеві. Урожайність пасовища 12 -17 ц/га сіна середньої якості.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 25 кБк/м². Середнє забруднення рослинності - 120 Бк/кг, середнє забруднення молока значно нижче ДР-2006, не перевищує 29 Бк/л.

Можливе докорінне поліпшення на більшій площі випасу шляхом проведення комплексу меліоративних, культуртехнічних та агротехнічних заходів.

с. Серхів

Випаси: урочища Вісоч, Засвіття, Сорока, Копань, Садок.

Навколо населеного пункту в достатній кількості та по площі розташовані природні угіддя що використовуються під випаси. Основна маса випасів невіддда, частково осушені болота та подекуди перелоги. Території для створення культурних пасовищ є.

урочище Вісоч

Природне угіддя розташоване на північний-схід від села. Угіддя не має чітких контурів і представляє собою череду відкритих площ і перелісків. Площа угіддя коливається в межах 20 га. Заболочених ділянок немає.

Відноситься до типу сухих дрібно травних злаково-різнотравних угідь на слаборозвинених піщаних ґрунтах та не задернованих пісках. Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані. Травостій рідкий і малопродуктивний. В засушливі періоди вибивається тваринами до ґрунту, дернина практично відсутня. Урожай низькоякісний не перевищує 5 ц/га.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 24 кБк/м², забруднення рослинності в межах 400 Бк/кг. Середнє забруднення молока коливається від 78 до 103 Бк/л в різні роки. Загалом забруднення молока знаходиться на межі допустимих рівнів. Наявність перевищень нормативу на даному випасі залежить від погодно кліматичних умов року обстеження.

Можливе докорінне поліпшення окремих ділянок випасу шляхом проведення комплексу агротехнічних заходів.

урочище Засвіття

Природне угіддя розташоване на західній частині території сільської ради відразу за околицею населеного пункту. Угіддя не має чітких контурів і є частиною великого болота. Болото сухе, прохідне, худоба випасається на площі близько 120 га.

Відноситься до типу вологих та сирих злаково-різнотравних й злаково-осокових луків на осушених торф'яно-болотних ґрунтах та торфовищах. Потужний торфовий шар сприяє розвитку рослинності. Рослинність на болоті представлена майже виключно різновидами осоки, одноманітна та малопоживна. Травостій густий, середньо продуктивний. Режим зволоження задовільний. Урожайність до 20 ц/га неякісного сіна.

Забруднення ґрунту ^{137}Cs в середньому становить 30 кБк/м², забруднення рослинності 310 Бк/кг. Середнє забруднення молока 39 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Можливе докорінне поліпшення на більшій частині угіддя шляхом проведення комплексу культуртехнічних та агротехнічних заходів.

урочище Садок

Природні угіддя розташовані на півдні населеного пункту відразу за городами селян. Низинні частково заболочені луки розкинулися навколо і вздовж каналу. Не має чітких меж, площа становить близько 15 га. Відкриті ділянки луків межують з чагарниками та площами порослими вербами та осиками. Навесні та в дощові роки частково затоплюється водою. Випас є хорошим пасовищем та сінокосом, але тривале затоплення приводить до утворення гідрофільних осокових угруповань з невеликою кількістю злакових трав та різнотрав'я. Ґрунти переважно мулувато-болотні та торф'яні. Рослинність середньо продуктивна. Зволоження надмірне. Врожайність до 25 ц/га.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs 85 кБк/м², рослинності 1250 Бк/кг. Середнє забруднення молока коливається від 130 до 261 Бк/л в різні роки спостережень. Перевищення ДР-2006 відмічене в усіх відібраних пробах. Максимальне перевищення сягає 315 Бк/л

Докорінне поліпшення випасу неможливе.

урочище Сорока

Пасовище на перелогах розташоване на сільськогосподарських полях, що виведені з обороту, починається відразу за південною-західною околицею населеного пункту. Угіддя має чіткі контури і складається з кількох окремих полів розділених сосновими борами. Загальна площа випасу близько 40 га. Ґрунти переважно дерново-підзолисті піщані.

Угіддя характеризується як сухі та помірно сухі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених дернових і дерново-підзолистих піщаних ґрунтах. Фітоценотичний тип рослинності - переважно пирійно-тонкомітлицеві. Пасовища з урожайністю 5-8 ц/га сіна середньої якості. Режим зволоження задовільний. В посушливі періоди рослинність низькоросла вибивається худобою до дернини.

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs 25 кБк/м², рослинності 550 Бк/кг. Середнє забруднення молока 42 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Можливе поліпшення випасу шляхом підсівання трави у дисковану дернину, внесення добрива та вапнування.

урочище Копань

Природні угіддя у вигляді лісового масиву розташовані на південний-схід від села. Угіддя не мають окреслених контурів. Типовий ландшафт соснових насаджень.

Лісові галявини та вирубки - є основними випасами для худоби. Заболочені ділянки відсутні. Худоба випасається прогоном туди і назад до 2 кілометрів.

Галявини характеризуються як свіжі злаково-різнотравні луки на слаборозвинених піщаних ґрунтах і слабо задернованих пісках. Фітоценотичний тип наземнокуничникові. Урожайність до 14 ц/га сіна низької якості

Середнє забруднення ґрунту ^{137}Cs 25 кБк/м², рослинності 900 Бк/кг. Середнє забруднення молока 72 Бк/л. Перевищення ДР-2006 не відмічене.

Поліпшення випасу не можливе